




第5版：农村与社区

上一版 < > 下一版



2009年12月30日 星期三

本报首页 | 版面导航 | 标题导航

< 上一篇 下一篇 >

放大 ⊕ 缩小 ⊖ 默认 ○

丹参辅治深静脉血栓

□ 韩咏霞 陕西省宝鸡职业技术学院

当静脉血流迟缓，血液处于高凝状态及血管内膜损伤时容易发生急性非化脓性炎症，在此基础上更容易继发静脉血栓形成。临床以下肢深静脉血栓多见，好发于骨折、创伤、手术后及产后。一旦发生下肢深静脉血栓，必须及早开展抗凝治疗，以防引发肺栓塞等严重并发症。

临床资料证实，在深静脉血栓形成早期给予肝素抗凝治疗的同时联用丹参注射液，可取得更加明显效果，症状和体征消退快，不良反应少，疗效优于单用肝素者。因为丹参不仅具有活血化瘀之功效，有助于降低血小板的聚集功能，可发挥抗血栓形成作用。同时，还具有温通血脉的功效，通过舒张血管，减少血流阻力和改善微循环，达到减轻组织肿胀，缓解疼痛及促进皮下瘀斑消退之目的。所以，在应用肝素的基础上加用丹参治疗深静脉血栓，疗效更佳，可使病程缩短。

一旦发生深静脉血栓，应从治疗一开始就使用丹参注射液，每次20毫升，加入5%葡萄糖液500毫升或5%葡萄糖等渗盐水500毫升中，每日1次静脉滴注。7天为1个疗程，必要时可再用1个疗程。用药期间要注意观察有无出血征象，若有出血现象（例如牙龈出血）应及时停用药物。

< 上一篇 下一篇 >

放大 ⊕ 缩小 ⊖ 默认 ○

国内统一刊号：CN11-0153 邮发代号：1-140(国内) D-1138(国外)
 地址：中国北京市朝阳区北沙滩甲4号 邮编：100192 电话：64854537
 传真：64854537 mail:cntcm@263.net.cn 广告热线：64853366
 Copyright 本网站内容版权所有，未经许可禁止转载， All Rights Resened