

妊娠期用药有何禁忌

妇女在怀孕期间，对于某些毒性较强和损害胎元的烈性药物，应该禁用或慎用。

禁用类：大多数是毒性较强，性猛力峻，破气破血和走窜降泄的药物。如乌头、巴豆、牵牛、大戟、商陆、芫花、甘遂、三棱、莪术、干漆、斑蝥、水蛭、虻虫、麝香、皂荚等。

慎用类：包括祛瘀通经、行气破滞、辛热滑利等药物。如桃仁、红花、牛膝、大黄、枳实、附子、肉桂、半夏、冬葵子、代赭石等。

禁用的药物不宜使用，慎用的药物可以根据病情，斟酌使用。但没有必要时，应尽量避免，以防发生事故。



第6版：健康关注

上一版 ◀ ▶ 下一版



版面导航



第1版 今日要闻



第2版 综合新闻



第3版 视点

标题导航

- ▶ 个性中医
- ▶ 何谓十八反、十九畏
- ▶ 经络通不通 教你来判断
- ▶ 妊娠期用药有何禁忌
- ▶ 手脚如何不“汗” 中医专家支招
- ▶ 益气药膳宜少量久食
- ▶ 中成药贮藏要注意什么

第1版：今日要闻



第2版：综合新闻



第3版：视点



第4版：学术与临床



第5版：农村与社区



第6版：健康关注



第7版：新疆特刊



第8版：新疆特刊



[第A9版：新疆特刊](#)



[第A10版：新疆特刊](#)



[第A11版：新疆特刊](#)



[第A12版：新疆特刊](#)



[个性中医](#)

[何谓十八反、十九畏](#)

[经络通不通 教你来判断](#)

[妊娠期间用药有何禁忌](#)

[手脚如何不“汗” 中医专家支招](#)

[益气药膳宜少量久食](#)

[中成药贮藏要注意什么](#)