



论著 | 老中医经验 | 学术探讨 | 临床报道 | 中药与方剂 | 学院专栏 | 综述 | 短篇报道 | 成药研究
消息 | 首医大中医药学院专栏 | 针灸经络 | 实验研究 | 燕京医史 | 中药房管理 | 临床中医学 | 中药制备 | 临床用药
中成药与单味中药研究 | 中药炮制与鉴别 | 临床中药学

北京中医
<http://bjtcm.itcmedu.com>



标准刊号：ISSN1000-4599 CN11-2558/R

• 本刊介绍 • 在线投稿 • 在线征订 >> 进入 北京中医药教育在线

会员登陆区

用户名:

密码:

忘记密码

免费注册

内容检索

请输入标题

请输入作者名

以往期刊查询

选择查询年份

选择查询期刊

精品推荐

2004年第12期 — 中药炮制与鉴别

三七与伪品三棱的性状鉴

作者：福建省福清市医院(350300) 陈锦屏 何通光 陈忠 点击次数：469次

三七在民间广泛流传着“有伤去伤，无伤进补”的说法。对治疗冠心病、动脉硬化疗效显著，社会需求量不断增大。现在有些不法分子为谋利将三棱加工之后冒充三七出售，严重危害人民身体健康。为了识别现将三七与三棱区别叙述如下：三七基源五加科植物人参三七干燥的根，呈不规则类圆形或纺锤形，长约3—5cm，直径约0.3—3cm，顶端有根茎残基，外表灰黄色或棕黑色有光泽，具断续的纵横皱纹及横向隆起的皮孔，并有支根的断痕，质坚实不易折断，断面木部与皮部常分离，皮部黄色、灰色或棕黑色，木部棕黑色，角质光滑有放射状纹理(习称铜皮铁骨)。气微，味先苦而后甜，以个大坚实体重皮细断面棕黑色无裂痕者为佳。

伪品三棱：基源：黑三棱科植物黑三棱的干燥去外皮块茎。性状：呈圆锥形或扁卵形，上圆下尖，大小长短不一，长2.5—5cm直径

1.5—3.5cm，有刀削痕迹。表面黄白色或灰黄色，有密集的小点状须根痕，略呈横向环状撑列，两侧面多凹凸不平，质坚实如木质，极难折断，切断面平坦呈黄色或灰白色，接近外表处色较深，向内侧色浅，内有多数散生不大明显的筋脉小点及条状横向筋脉(断面用水润后点状及条状筋脉明显)。气微弱，微有酸臭气或无臭，味淡微苦，性平，嚼之微有麻辣感。

综上所述三七与三棱是两种不同科属不同功能的植物人工造仿，请同道共同识别。

[>>进入讨论](#)