



2009年11月12日 星期四

← 上一篇 下一篇 →

第4版: 学术与临床

上一版 ◀ ▶ 下一版



标题导航

- 恶性肿瘤及转移从痰论治
- 张学文用药配伍经验
- 附子与半夏合用探源
- 中医辨治食管癌分四型

附子与

□ 毛进军

笔者临证辨治时，常常据证将半夏与这样配伍，似乎违反了中药所谓“十八反配”。但实际上，附子并不等同于乌头，二者有别，附子是乌头块根上所附生的子根，功根（母根），分为川乌和草乌两种，川乌温经止痛之功，乌头祛风通痹之力较附子祛风”之说，而乌头的毒性较附子为大，

在《神农本草经》中有“乌头反半夏”乌头虽然在同一条目下论述，但也没有提疗胃冷有痰的小方，如在论述附子条的附姜十片，水两盏，煎七分，空心温服。一

《本经》中规定栝楼是反乌头的，而可以同用，如《中医内科学》五版、七版白白酒汤加枳实、桂枝、附子、丹参、檀

实际上，《本经》也是将附子与乌头中，金创，破癥坚积聚，血瘀，寒温，踈李氏苦有毒，大温。”谓乌头曰：“味辛积聚，寒热。又云：乌喙，神农雷公桐君“乌头，乌喙，莽草为使，反半夏”，“子，地坦为使，畏防风，甘草，黄芪，人

附子与半夏相伍同用，首推医圣张仲条文曰：“腹中寒气，雷鸣切痛，胸胁逆满腹痛，故以附子粳米汤温中散寒，化饮草、大枣、粳米。方中附子补阳益火，祛胃，与附子相配可助附子祛除阴寒湿浊之阳不足，寒邪内阻，阴寒湿浊上犯之证相

自古至今，历代医家据证制方时以附中治疗饮酒后及伤寒饮冷水过多所致五饮民和剂局方》中治疗脾肾久虚，荣卫不足，中汤”，方中附子引火归元，半夏和胃健黑，身背强，四肢冷，妇人血室痼冷沉寒床家李可也是最善于以附子伍半夏治疗疑破格救心汤与小青龙汤合方治疗肺心病心子同用，回阳涤痰，力大效彰。这说明古为相反之药看待。

综上所述，笔者认为，只要临证辨证夏”之说而株连到附子，该相伍时就相伍药，“主治病多应地，有毒，不可久服”，中病即止，不能长期大量服用。

◀ 上一篇 下一篇 ▶

国内统一刊号：CN11-0153 邮发代号：1-140(国内) D-1138
地址：中国北京市朝阳区北沙滩甲四号 邮编：100192 电话：
传真：64854537 mail:cntcm@263.net.cn 广告热线：6485
Copyright 本网站内容版权所有，未经许可禁止转载， All Right