

论著

胆囊结石联合胆汁病理检查诊断华支睾吸虫感染

蔡洪英^{1,2} 乔铁^{2*} 罗小兵^{2, 3} 邓纯敏¹

1511470广州, 广州市番禺区第二人民医院病理科;

2 511470广州, 广州市番禺区胆囊病研究所; 3 511470广州, 广州市番禺区第二人民医院检验科

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 探讨胆囊结石联合胆汁病理检查诊断胆囊结石患者合并华支睾吸虫感染的可行性。方法 采用粪便直接涂片、胆汁离心镜检和胆囊结石病理切片镜检等方法, 检查350例胆囊结石患者的粪便、胆汁和结石标本中的华支睾吸虫虫卵, 分析3种方法的检出率。结果 粪便直接涂片法、胆汁离心镜检和胆囊结石病理切片镜检华支睾吸虫虫卵的检出率分别为29.4% (103/350)、41.5% (145/350)和44.2% (155/350)。与胆汁离心镜检法相比, 粪便直接涂片法检出率最低 ($\chi^2=11.05$, $P < 0.05$), 胆囊结石病理切片镜检的检出率差异无统计学意义 ($\chi^2=0.583$, $P > 0.05$)。胆汁、胆石联合检出率为67.7% (237/350), 明显高于其它方法 ($\chi^2=48.77$, $P < 0.05$)。结论 胆囊结石与胆汁联合病理检查虫卵可提高胆囊结石患者感染华支睾吸虫的诊断率。

关键词 [胆囊结石](#); [胆汁](#); [华支睾吸虫](#); [虫卵](#); [病理诊断](#)

分类号

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4122.2013.05.009

通讯作者:

乔铁 fqj1958@163.com

作者个人主页: 蔡洪英^{1,2} 乔铁^{2*} 罗小兵^{2,3} 邓纯敏¹

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(590KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)

▶ [参考文献 \[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“胆囊结石; 胆汁; 华支睾吸虫; 虫卵; 病理诊断”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [蔡洪英¹](#)

• [2 乔铁^{2*} 罗小兵²](#)

• [3 邓纯敏¹](#)