

西藏密花树属(紫金牛科)一新变种*

郑维列

姚淦

(西藏高原生态研究所, 林芝 860000)

(中科院江苏植物研究所, 南京 210014)

A NEW VARIETY OF RAPANEA (MYRSINACEAE) FROM XIZANG (TIBET)

Zheng Weilie¹, Yao Gan²

(¹Tibet Institute of Plateau Ecology, Linzhi 860000)

(²Jiangsu Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210014)

关键词 密花树属, 西藏密花树

Key words *Rapanea*, *R. kwangsiensis* var. *tibetica*

西藏密花树 新变种

Rapanea kwangsiensis Walder var. *tibetica* W. L. Cheng et K. Yao, var. nov.

A varietate differt foliis ellipticis ad late lanceolatis, 11~22.5 cm longis, 3.5~8 cm latis, pedicellis 1~1.5 mm longis, fructibus globosis vel oblique turbinatis 4~8 mm longis.

Xizang(Tibet, 西藏): Linzhi(林芝), alt. 2 000 m, 1996-05-13, W. L. Zheng(郑维列) 0974 (Typus, Herb. of Inst. of Plateau Ecology, Tibet); ibid alt. 1 600 m, 1994-04-19, Group of the Tsangpo River 0142; ibid alt. 1 650 m, 1994-10-30, Group of the Tsangpo River 1097.

本变种与原变种的区别为叶椭圆形至长圆状披针形, 长 11~22.5 cm, 宽 3.5~8 cm 花梗长 1~1.5 mm, 果球形或斜陀螺形, 长 4~8 mm。

* 本文承陈介教授审阅, 特此致谢。

1997-01-21 收稿, 1997-03-28 接受发表