

# 我国鼎湖山的担子菌类

## II. 牛肝菌科的种之一\*

毕志树 陆大京 郑国扬

(广东省微生物研究所, 广州)

本文记载了在广东鼎湖山所采到的牛肝菌科新种 6 种和新记录 3 种。它们是粘胶条孢牛肝菌 (*Boletellus viscosus* Bi et Loh sp. nov.), 普通条孢牛肝菌 (*Boletellus vulgaris* Bi sp. nov.), 类小牛肝菌 (*Boletinus cavipoides* Bi et Zheng sp. nov.), 美牛肝菌 (*Boletus puellaris* Bi et Loh sp. nov.), 小橙黄牛肝菌 (*Boletus miniato-aurantiacus* Bi et Loh sp. nov.) 和拟细牛肝菌 (*Boletus pseudo-parvulus* Bi sp. nov.) 等 6 个新种以及混杂松塔牛肝菌 (*Strobilomyces confusus* Singer), 褐变牛肝菌 (*Boletus indecisus* Peck) 和栗褐小牛肝菌 (*Boletinus castanellus* Peck) 等 3 个新记录。以上全部标本保存于广东省微生物研究所标本室 (HMIGD)。

用作观察微观结构的化学试剂为 5% KOH 液, 14% NH<sub>4</sub>OH 液, 14% HNO<sub>3</sub> 液, 10% FeSO<sub>4</sub> 液以及 Melzer 氏液 (碘化钾 1.5 克, 碘 0.5 克, 蒸馏水 22 毫升和水合三氯乙醛 22 克)。

### 1. 粘胶条孢牛肝菌 新种 图 1, 14—15

*Boletellus viscosus* Bi et Loh sp. nov.

菌盖宽 5—9.5 厘米, 上覆一薄层透明粘液, 极胶粘滑, 初扁球形, 渐呈平展凸突形, 表面有陷窝, 灰褐色至红褐色, 肉质, 上有绒毛成网纹状, 边缘延伸、波状。菌肉橙黄色, 厚 7 毫米, 受伤时变血红色, 无味。菌管表黄色或略带绿色, 管长 5—20 毫米, 受伤时不变色, 菌管层在柄周围下陷至离生; 菌孔圆形, 直径 0.5—1 毫米, 与管同色。柄长 14—25 厘米, 粗 5—10 毫米, 细长, 上部灰褐色, 下部红褐色, 有粘液, 圆柱形, 空心, 光滑, 上有纵条纹, 基部略膨大。菌环上位, 单环, 上表污绿色, 下表白色, 活动, 易脱落。孢子广椭圆形至近球形, 有纵纹稜, 黄褐色, 10.5—14 × 9—10.5 微米, 复原时在 KOH 液为棕黄色, 在 Melzer 氏液呈深棕黄色。担子 17—21 × 7—8 微米, 棒状, 顶膨大近圆形, 具双孢, 无色, 复原时遇 KOH 液变淡黄色, 遇 Melzer 氏液变淡黄色。侧生囊状体 25—30 × 8—10 微米, 棒状, 散生, 少, 复原时在 KOH 液和 Melzer 氏液黄色。菌管菌髓为非平行型, KOH 液淡黄色, Melzer 氏液则为黄色。菌肉菌丝无色至淡黄色, 无论在 KOH 液及 Melzer 氏液中均为淡黄色。有锁状联合。菌盖

本文于 1980 年 12 月 29 日收到。

\* 承中国科学院微生物研究所应建浙同志和中国科学院华南植物研究所黄成就同志审阅本文, 并提出了宝贵的意见; 本所练明忠、李泰辉、胡炎兴、梁建庆、李崇以及郑婉玲等同志参加部分工作, 特此致谢。




图1 牛肝菌科 (Boletaceae) 1—3. 混杂松塔牛肝菌 (*Strobilomyces confusus* Singer); 1. 子实体, 2. 囊状体, 3. 担孢子; 4—6. 拟细牛肝菌 (*Boletus pseudo-parvulus* Bi sp. nov.); 4. 成熟子实体, 5. 未成熟子实体, 6. 担孢子; 7—8. 美牛肝菌 (*Boletus puellaris* Bi et Loh sp. nov.); 7. 子实体, 8. 担孢子; 9—10. 小橙黄牛肝菌 (*Boletus miniato-aurantiacus* Bi et Loh sp. nov.); 9. 子实体, 10. 担孢子; 11—13. 栗褐小牛肝菌 (*Boletinus castanellus* Peck); 11. 子实体的上表面, 12. 子实体的下表面, 13. 担孢子; 14—15. 粘胶条孢牛肝菌 (*Boletellus viscosus* Bi et Loh sp. nov.); 14. 子实体, 15. 担孢子; 16—18. 普通条孢牛肝菌 (*Boletellus vulgaris* Bi sp. nov.); 16. 子实体的上表面, 17. 子实体的下表面, 18. 担孢子; 19—20. 褐变牛肝菌 (*Boletus indecisus* Peck); 19. 子实体, 20. 担孢子; 21—23. 类小牛肝菌 (*Boletinus cavipoides* Bi et Zheng sp. nov.); 21. 子实体的上表面, 22. 子实体的下表面, 23. 担孢子。

遇 KOH 液为茶褐色；菌肉遇 KOH 液、 $\text{NH}_4\text{OH}$  液或  $\text{HNO}_3$  液均变淡黄色，遇  $\text{FeSO}_4$  液则为深绿色。单生至散生于阔叶林的地上。广东鼎湖山庆云寺至老鼎的山坡上及草塘路旁山坡。1980 VII 16 及 IX 8，毕志树等 733 (HMIGD 4733，模式)。

本菌虽属于花孢组 *Allospori* Singer 中的类型，菌盖胶粘，很象 *Boletellus betula* (Schweinitz) Gillert，但具有许多特性如有菌环；孢子上有纵条纹而非小疣，且孢子比较小；菌肉受伤时变血红色；菌盖表面凹凸不平，上有绒毛以及整个菌体均极胶粘等，显然与 *Boletellus betula* 不同〔1,3,6,7〕。另与 *Boletus longicollis* Ces. 在许多性状上基本上相似，主要不同是本种盖缘缺粘的残留菌幕以及菌肉受伤时变血红色而非不变色〔4〕。

Pileus 5—9.5 cm latus, mucum tenue hyalino obducens, plus glutinosus et lubricus, primo obtuse conicus, dein plano-convexus, scabridiusculus, pallido-badius vel rubro-brunneus, carnosus, villosus-tomentosus, dein reticulatus, margine porrectus, undulato. Caro aurantio-flava, 7 mm crassa, post tactum sanguinescens, sapor nullus. Tubuli superficies lutei vel leviter viridulis, 5—20 mm longi, immutabiles, ad stipitem depressi et demum saepe secedentes, poris ovatis, 0.5—1 mm diam., concoloribus. Stipes 14—25 cm longus, 5—10 mm crassus, gracilis, in parte superiore pallido-badius, in parte inferiore rubro-brunneus, viscidus, cylindraceus, cavus, laevigatus et striatus, basin versus leniter incrassatus. Annulus superus, singularis, supra superficie sordido-viridis, infra albus, mobilis, fugacus. Sporae late ellipsoideae vel ovoideae, longitudinaliter striatae, flavo-badiae,  $10.5-14 \times 9-10.5 \mu\text{m}$ . Solitario vel sparsim ad terram in silva. Guangdong, Dinghu Mountain. 1980 VII 16 & IX 8. Coll. Bi & al. 733, typus in herbario Microb. Inst. Guangdong conservatus (HMIGD 4733).

## 2. 普通条孢牛肝菌 新种 图 1: 16—18

*Boletellus vulgaris* Bi sp. nov.

菌盖宽 1.6 厘米，粘，黄褐色，边缘土黄色，平展脐凸形，上有绒毛；边缘延伸并整齐。菌肉白色，受伤时不变色，厚约 3 毫米，无味。柄中生，黄褐色， $5 \times 0.3$  厘米，略弯曲，圆柱形，实心，基部稍膨大，上有绒毛，柄表皮易剥落。菌管紫色，受伤时不变色，长 3 毫米，与柄垂直；菌孔角形，直径 1 毫米。孢子纺锤形，在显微镜下呈淡红紫色，具小疣， $12-13 \times 6.6-9$  微米。单生于阔叶林的地上。鼎湖山庆云寺附近。1980 VIII 19，毕志树等 454 (HMIGD 4454，模式)。

此种属于 *Boletellus* 属的花孢组 *Allospori*，其突出性状是具紫色、多角形的大菌孔，菌盖大小与柄相比柄很长，与 *Boletellus ridiculus* Corner 相似，但菌盖和菌管表的色泽以及孢子形态、大小均有差异〔4〕。

Pileus 1.6 cm latus, glutinosus, fulvus, margine sordide flavus, dein plano-convexus, villosus-tomentosus, margine porrectus, integris. Contexto albo, immutabili, 3 mm crasso, sapor nullus. Stipes centralis, flavobadius,  $5 \times 0.3$  cm,

leviter sinuosus, cylindraceus, solidus, aequalis vel ad basin subincrassatus, tomentosus, cuticula facile delapsus. Tubuli punicei, immutabiles, 3 mm longi, ad stipitem appendiculati, poris angularibus, 1 mm diam. Sporae fusiformes, sub microscopio pallide rubropurpureae, verrucosae, 12—17 × 6.6—9 μm. Solitarius ad terram in silva. Dinghu Mountain. 1980 VII 19. Coll. Bi & al. 454, typus in herbario Microb. Inst. Guangdong conservatus (HMIGD 4454).

### 3. 类小牛肝菌 新种 图 1: 21—23

*Boletinus cavipoides* Bi et Zheng sp. nov.

菌盖宽 2—5.2 厘米，扁半球形，渐平展，粘，黄带白色，肉质，上有白色绒毛；边缘波状，且有一条褐线。菌肉黄带白色，近柄处厚约 10 毫米，向边渐消失，受伤时不变色，无味。柄偏生，与盖同色，长 3.5—4 厘米，粗 7—10 毫米，圆柱状，实心，上有绒毛。菌管黄色，受伤时不变色，管长 2—4 毫米，易剥离，与柄成缺齿延生；菌孔角形至不规则形，呈放射状排列，每毫米 1—2 个，大。孢子椭圆形，光滑，在显微镜下为浅黄色，7—10.5 × 3—3.5 微米，内含 1 个油球。复原时在 KOH 液为淡黄色，Melzer 氏液黄色。担子 15—24 × 5—7 微米，棒状，顶部略膨大，具双孢，在 KOH 液内无色，Melzer 氏液淡黄色。侧生囊状体 28—43 × 5—7 微米，多，棒状，淡黄色，KOH 液淡黄色，Melzer 氏液黄色。管缘囊状体 35—63 × 6—7 微米，棒状，集中，成栅栏状排列，多，表面粗糙，淡黄色，KOH 液淡黄色，Melzer 氏液黄色。菌管菌髓为正面侧向型，KOH 液无色，Melzer 氏液淡黄色。菌盖外皮层为已分化的枝生菌丝组成。菌肉菌丝淡黄色，无论在 KOH 液或 Melzer 氏液均呈淡黄色。锁状联合缺。菌盖遇 KOH 液为黑色；菌肉遇 KOH 液茶色，遇 NH<sub>4</sub>OH 液淡茶黄色，HNO<sub>3</sub> 淡黄色，FeSO<sub>4</sub> 液则为紫黑色。群生于阔叶林的地上。鼎湖山草塘附近。1980 IX 8，毕志树等 737 (HMIGD 4737, 模式)。

本菌与 *Boletinus cavipes* (Opat.) Kalchbr. 相近似，但显著差别在于菌盖粘，上只生白色而非橙红色的绒毛，且不裂呈鳞片状。从其对化学的反应看也有差异<sup>[4, 6]</sup>。

Pileus 2—5.2 cm latus, obtuse hemisphaericus, dein planus, viscosus, flavus vel interdum pallido-flavescent, carnosus, albido-vellosus-tomentosus, margine undulato, brunneo-lineato. Caro albido-flava, ad stipitem circiter 10 mm crassa, margine versus evanescens, immutabilis, sapor mitis. Stipes excentricus, concoloris, 3.5—4 cm longus, 7—10 mm crassus, cylindraceus, solidus, villosus-tomentosus. Tubuli flavi, immutabiles, 2—4 mm longi, facile denudati, decurrentes, pori angulares vel irregulares, radiati dispositi, 1—2 per mm. Sporae ellipsoideae, laeves, sub microscopio pallidoflavae, 7—10.5 × 3—3.5 μm, 1 guttatae. In greges ad terram in silva. Guangdong, Dinghu Mountain. 1980 IX 8. Coll. Bi & al. 737, typus in herbario Microb. Inst. Guangdong conservatus (HMIGD 4737).

### 4. 美牛肝菌 新种 图 1: 7—8

*Boletus puellaris* Bi et Loh sp. nov.




图2 七种牛肝菌孢子电子扫描图 1.粘胶条孢牛肝菌 *Boletellus viscosus* Bi et Loh ( $\times 7000$ ); 2.小橙黄牛肝菌 *Boletus nitidato-aurantiacus* Bi et Loh ( $\times 7500$ ); 3.褐突牛肝菌 *Boletus indectus* Peck ( $\times 10000$ ); 4.粗纹低塔牛肝菌 *Strobilomyces confusus* Sing ( $\times 8900$ ); 5.类小牛肝菌 *Boletinus covipoides* Bi et Zheng ( $\times 15000$ ); 6.拟小牛肝菌 *Boletus pseudo-parvulus* Bi ( $\times 3800$ ); 7.美牛肝菌 *Boletus puellaris* Bi et Loh ( $\times 7800$ ).

菌盖宽1.5—5厘米，粘，凸镜形，淡茶褐至茶褐色，上有短绒毛；边缘内卷。菌肉白色，受伤时变微红，近柄处厚约2—6毫米，无味。柄中生，长2.2—5.5厘米，粗4—10毫米，白带黄色，圆柱状，实心，上有棕褐色绒毛，有云母光泽。菌管黄色，擦伤时不变色，管层在柄四周下陷或短延生，管长3—7毫米，不易剥离；菌孔圆形至角形，每毫米1—3个。孢子椭圆形至梭形，光滑，浅黄色，一端有芽孔， $10-11 \times 3.5-5$ 微米，内含1个油球，复原时在KOH液无色至微带黄色，Melzer氏液淡黄色。担子 $28 \times 6$ 微米，棒状，具2—3孢，KOH液无色，Melzer氏液黄色。囊状体未见。菌管菌髓为平行型，KOH液灰白色，Melzer氏液黄色。菌盖的外皮层菌丝膨大近圆形。菌肉菌丝未见锁状联合。菌盖遇KOH液变淡红褐色。菌肉遇KOH液或 $\text{HNO}_3$ 液褐色带黄，遇 $\text{NH}_4\text{OH}$ 液黄色， $\text{FeSO}_4$ 液则呈灰紫色。群生至簇生于混交林的地上。鼎湖山旅行社后坡。1980 X 5，毕志树等630 (HMIGD 4630，模式)。

与 *Leccinum variabile* Smith, Thiers & Watling 近似，但本种的孢子小且多有芽孔；菌柄也比较短细；菌管表呈黄色而不是经擦伤后始由白变黄的〔6〕。另与 *Boletus communis* Bull. var. *mutatis* Schultz 在个别处亦有类似，然而本种菌管表受伤时显然未见变绿色〔2〕。

Pileus 1.5—5 cm latus, viscidus, convexus, pallido-umbrinus vel umbrinus, velutinus; margine ineurvato. Contextus albidus, tactu leviter rubro, ad stipitem circiter 2—6 mm crassus, sapor mitis. Stipes centralis, 2.2—5.5 cm longus, 4—10 mm crassus, albidus vel interdum pallide flaviscens, cylindraceus, solidus, aetate ochraceus pubescens, nitidus. Tubuli flavi, immutabiles, ad stipitem depressi et demum breve decurrentes, 3—7 mm longi, haud facile denudati; pori ovati vel angulares, 1—3 per mm. Sporae ellipsoideae vel fusiformes, laeves, pallido-flavae. Pori germinationis adsunt,  $10-11 \times 3.5-5 \mu\text{m}$ , 1 guttatae. Gregarius vel caespitosus ad terram in silva. Dinghu Mountain. 1980 X 5. Coll. Bi & al. 630, typus in herbario Microb. Inst. Guangdong conservatus (HMIGD 4630).

#### 5. 小橙黄牛肝菌 新种 图1: 9—10

*Boletus miniato-aurantiacus* Bi et Loh sp. nov.

菌盖宽1—1.6厘米，干，扁半球形，橙黄色，密生微细绒毛。菌肉黄色，受伤时不变色，近柄处厚2—3厘米，无味道和气味。柄中生，长3—3.3厘米，粗3—6毫米，白色，下部呈黄色，近柱状，实心，上有绒毛。菌管白色，受伤时不变色，与柄附着沿生，管长3毫米，易剥离；菌孔圆形，大，直径约3毫米。孢子椭圆形，光滑，浅黄色， $7-10 \times 3.3-4$ 微米，内多含1个油球，复原时在KOH液淡黄色，Melzer氏液黄色。只见侧生囊状体。担子 $30 \times 7.3$ 微米，棒状，无色，KOH液带灰黄色，Melzer氏液红褐色。侧生囊状体 $35 \times 6.5$ 微米，很少，KOH液无色，Melzer氏液黄色。菌管菌髓为平行或正面侧向型，KOH液淡黄色，Melzer氏液黄褐色。菌盖外皮层菌丝淡黄色，枝生，粗3—4.5微米。菌肉菌丝在KOH液无色，Melzer氏液浅黄色。无锁状联合。菌盖遇KOH液黄褐色。菌肉遇KOH液、 $\text{NH}_4\text{OH}$ 液或 $\text{HNO}_3$ 液均呈黄褐色，遇 $\text{FeSO}_4$

液则为灰黑带蓝色。簇生至群生于混交林靠近羊蹄甲 (*Bauhinia purpurea*) 树下地上。鼎湖山疗养院门前路旁。1980 IX 6, 毕志树等 677 (HMIGD 4677, 模式)。

此种菌体与国内外所记述有关橙黄色菌盖的类型均显得比较细小, 而且性状亦很不一致[2, 3, 6, 7]。

Pileus 1—1.6 cm latus, siccus, obtuse hemisphaericus, aurantiacus, confer-tim et minute villosus-tomentosus. Contexto flava, immutabili, ad stipitem 2—3 cm crasso, sapor mitis et odor nullus. Stipes centralis, 3—3.3 cm longus, 3—6 mm crassus, albidus, in parte inferiore flavus, subcylindraccus, solidus, velutinus. Tubuli albidus, immutabiles, ad stipitem breviter decurrentes, 3 mm longi, facile denudati; pori ovati, majusculi, 3 mm diam.. Sporae ellipso-ideae, laeves, pallido-flavae, 7—10 × 3.3—4 μm, 1 guttatae. Pleurocystidiis 35 × 6.5 μm, paucis. Caespitosus vel gregarius ad terram in silvis mixtis, prope *Bauhinia purpurea* (*Bauhinia ourourea*). Dinghu Mountain. 1980 IX 6. Coll. Bi & al. 677, typus in herbario Microb. Inst. Guangdong conservatus (HMIGD 4677).

#### 6. 拟细牛肝菌 新种 图 1: 4—6

*Boletus pseudo-parvulus* Bi sp. nov.

菌盖宽 1.3—4.7 厘米, 凸镜形, 粘, 紫红色, 上有白色绒毛; 边缘微内卷。菌肉白色, 近柄处厚约 3—7 毫米, 受伤时变淡紫红色, 有苦味, 无气味。柄中生, 长 2—4.3 厘米, 粗 4—14 毫米, 淡褐色, 圆柱状, 实心, 向下有时略膨大, 上有短的白绒毛和条纹。菌管白色, 管里肉色, 受伤时变浅褐色, 管长 1—3.5 毫米, 易剥离; 菌孔圆形, 每毫米 4—5 个, 与菌柄离生或成缺刻附生。孢子长椭圆形, 光滑, 无色, KOH 液无色, Melzer 氏液黄色, 6.6—10 × 3—3.3 微米。担子 18 × 7 微米, 棒状, 顶部膨大, 具双孢, 无色, KOH 液无色, Melzer 氏液淡黄色。侧生囊状体 17—25 × 6—7 微米, 棒状, 少, KOH 氏液无色, Melzer 液黄色。管缘囊状体 10—12 × 5—5.5 微米, 棒状, 少, KOH 液无色, Melzer 氏液黄色。柄囊状体缺。菌管菌髓为反面侧向型。菌盖外皮层菌丝分化不甚明显。菌肉菌丝无色, KOH 液淡黄色, Melzer 黄色。无锁状联合。菌盖遇 KOH 液为紫黑色略带红色; 菌肉遇 KOH 液、NH<sub>4</sub>OH 液或 HNO<sub>3</sub> 液变淡黄色, 遇 FeSO<sub>4</sub> 液则略呈淡绿色。群生于针叶林中锥栗 (*Castanopsis chinensis*) 和大叶桉 (*Eucalyptus robusta*) 根部周围的地上。鼎湖山疗养院后坡上。1980 IX 6, 毕志树等 660 (HMIGD 4660, 模式)。

与 *Boletus parvulus* Coker & Beers 相似, 但主要区别为菌盖粘, 菌肉受伤时直接变淡紫红色, 味苦; 而且孢子无色, 长椭圆形, 一端并无尖突[3]。

Pileus 1.3—4.7 cm latus, convexus, viscosus, purpureo-rubellus, sapor amarus et odor nullus. Stipes centralis, 2—4.3 cm longus, 4—14 mm crassus, pallido-badius, cylindraccus, solidus, interdum basin versus leviter incrassatus, albo-velutinus et striatus. Tubuli albidus, intus carnosus-colored, tactu pallido-brunnei, 1—3.5 mm longi, facile denudati; pori ovati, 4—5 per mm, ad

stipitem saepe secedentes et demum decurrentes. Sporae oblongo-ellipsoideae, laeves, hyalinae,  $6.6-10 \times 3-3.3 \mu\text{m}$ . In greges ad terram in silvis. Dinghu Mountain, 1980  $\text{X}$  6. Coll. Bi & al. 660, typus in herbario Microb. Inst. Guangdong conservatus (HMIGD 4660).

### 7. 混杂松塔牛肝菌 新记录 图 1: 1—3

*Strobilomyces confusus* Singer, Farlowia 2: 108, 1945

菌盖扁半球形，渐平展，干，宽2.5—4.5厘米，茶褐色，上有小块贴生鳞片，中央有一些鳞片直立，部分鳞片易脱落成光滑。菌肉白色，受伤后变血红色，厚5—7毫米，柄圆柱形，与盖同色，内实，老熟时中空，光滑，有沟纹，长4—6厘米，粗5—7毫米，受伤后变血红色，但柄或菌肉干后却无此现象。菌管表初呈污白色，受伤时或老熟后均变为与盖同色，菌管层与柄垂直至离生，管长4—7毫米；菌孔多角形，直径1毫米。孢子黄褐色，近球形，有细疣或突起， $7-11 \times 7-8$ 微米，内含1—2个油球，复原时在KOH液黄褐色，Melzer氏液暗黄褐色。担子 $23 \times 7$ 微米，棒状，淡黄色，KOH液淡褐色，Melzer氏液淡黄褐色。管缘囊状体棒状或圆锥状， $35-50 \times 10-14$ 微米，复原时在KOH液或Melzer氏液均呈黄褐色。菌管菌髓为平行或正面侧向型，KOH液淡黄色，Melzer氏液深黄褐色。菌盖外皮层菌丝不规则，少分枝，粗5—9微米。锁状联合缺。菌盖遇KOH液变黑色；菌肉遇KOH液、 $\text{NH}_4\text{OH}$ 液或 $\text{HNO}_3$ 液均为灰褐色，遇 $\text{FeSO}_4$ 液变灰蓝色。单生或散生于混交林的地上。鼎湖山树木园旅行社间的山坡上。1980 V 13, 毕志树等 123 (HMIGD 4123)。

本菌与邓叔群所描述的 *Boletellus schichianus* (Teng et Ling) Teng 相似，但菌肉和柄受伤后均变为明显的血红色<sup>[4]</sup>。同时与 *Strobilomyces floccopus* (Vahl ex Fr.) Karst 不同，因菌盖上的鳞片不明显直立，柄上缺鳞片，且孢子上有细疣或突起而不是呈网纹状<sup>[1,2,5,6,7]</sup>。

### 8. 褐变牛肝菌 新记录 图 1: 19—20

*Boletus indecisus* Peck, Ann. Rept. N. Y. State Mus. 41: 76, 1888

— *Tylopilus indecisus* (Peck) Murrill, Mycologia 1: 15, 1909

菌盖宽5.5—6.5厘米，凸镜形，后平展，形不太规则，浅茶色至黄褐色，潮湿时粘，压伤时变褐色，上密生绒毛。菌肉白色，厚为10—11毫米，受伤时变褐色，无味。柄中生至偏生，长5—10厘米，粗9—13毫米，近柱状，实心，不等粗，上有细毛，以上部为多，有时密集成小鳞片状，并有纵条纹，上部有细网纹。菌管表初白带黄色，渐变浅黄褐色，受伤时变褐色，与柄直生或成缺刻附生，管长4—4.5毫米，不易剥离；菌孔角形，每毫米2—4个。孢子长椭圆形，光滑，无色， $7-9 \times 2.5-3.5$ 微米，内含1—2个油球，复原时在KOH液无色，成堆时微黄色，Melzer氏液黄色，略带轻微蓝色，孢壁色深。担子 $18-23 \times 6-7$ 微米，囊状，具4孢，KOH液黄色，Melzer氏液淡黄色。侧生囊状体 $35-50 \times 10-15$ 微米，梭形，多，无色，KOH液浅黄色，Melzer氏液棕红色。管缘囊状体 $30-38 \times 6-11$ 微米，少，梭形，无色，KOH液浅黄色，Melzer氏液棕红色，个别无色。柄囊状体未见。菌管菌髓为平行型，少数为反面侧向型，KOH液无色至微黄色，Melzer氏液黄色。菌盖表皮菌丝匍匐状，棕色，粗6微米；外皮层菌



丝无色，直径 5 微米，稍分枝；下皮层菌丝分枝明显，径粗 5—7 微米。菌肉菌丝无色，KOH 液无色，Melzer 氏液呈棕黄色。有锁状联合。菌盖遇 KOH 液变茶褐色；菌肉遇 KOH 液或  $\text{NH}_4\text{OH}$  液变浅黄色，遇  $\text{HNO}_3$  液红褐色， $\text{FeSO}_4$  液则变紫蓝色。单生于混交林的地上。鼎湖山庆云寺至白云寺半路山脚及茶场至旅行社山旁。1980 Ⅸ 8，毕志树 728 (HMIGD 4728)。

与国外报道的相近似，主要不同是孢子在显微镜下呈无色而非肉褐色，且柄上有细绒毛，有时略呈小鳞片状而不是光滑<sup>[3,6,7]</sup>。

#### 9. 栗褐小牛肝菌 新记录 图 1: 11—13

*Boletinus castanellus* Peck, Bull. Torr. Bot. Club 27: 613, 1900

菌盖宽 1.1 厘米，扁半球形，后平展，干，灰褐色，上有微细绒毛，肉质；边缘内卷。菌肉黄白色，薄，无味。柄中生， $2 \times 0.15$  厘米，棒状，实心，黄色，上有褐色绒毛和纤毛。菌管表黄色，管层与柄衍生；菌孔角形，每毫米 2 个，呈辐射状排列，蜂窝状，为褶状片所分隔。孢子广椭圆形，光滑，浅黄色， $7-9 \times 4-5$  微米，内含 1 个大油球，有芽孔，Melzer 氏液棕黄色。担子  $25 \times 5-8$  微米，具 4 孢，无色，遇 KOH 液不变色，遇 Melzer 氏液变浅黄色。管缘囊状体  $35 \times 8$  微米，长囊状，无色。菌管菌髓为非平行或正面侧向型，KOH 液无色，Melzer 氏液黄色。菌盖表皮菌丝不规则，外皮层菌丝平行分枝。无锁状联合。菌盖遇 KOH 液变棕褐色；菌肉遇 KOH 液变棕褐色，遇  $\text{NH}_4\text{OH}$  液或  $\text{HNO}_3$  液浅棕褐色， $\text{FeSO}_4$  则变棕褐色。单生于阔叶林的地上。鼎湖山教工疗养院附近山坡。1980 Ⅶ 11，毕志树等 308 (HMIGD 4308)。

本种据 R. Singer 1945 年在 *Farlowia* 卷二，第 257 页指出，因原模式已不存在，此名称可能是其他种混用的异名。本文暂用此名，待考<sup>[3, 5]</sup>。

### 参 考 文 献

- [1] 邓叔群, 1963: 中国的真菌。科学出版社, 北京。
- [2] 裘维番, 1957: 云南牛肝菌图志。科学出版社, 北京。
- [3] Coker, W.C. & A.H. Beers, 1943: *The Boletaceae of North Carolina*. University of North Carolina Press.
- [4] Corner, E.J.H., 1972: *Boletus in Malaysia*. Singapore.
- [5] Singer, R., 1945: *The Boletineae of Florida with notes on extralimital species*. I. *The Strobilomycetaceae*. *Farlowia* 2: 97—141.
- [6] Smith, A.H. & H.D. Thiers, 1971: *The Boletes of Michigan*. University of Michigan Press.
- [7] Snell, W.H. & E.A. Dick, 1970: *The Boleti of Northeastern North America*. J. Cramer, Germany.

## BASIDIOMYCETES FROM DINGHU MOUNTAIN OF CHINA

### II. Some new species of Boletaceae (1)

Bi Chi-shu, Loh Ta-ching and Zheng Gou-yang  
(*Institute of Microbiology of Province Guangdong, Guangzhou*)

#### Abstract

This report includes six new species and three new records of *Boletaceae*. Specimens were collected and identified by the authors. The new species are: *Boletellus viscosus* Bi & Loh sp. nov., *Boletellus vulgaris* Bi sp. nov., *Boletinus cavipoides* Bi & Zheng sp. nov., *Boletus puellaris* Bi & Loh sp. nov., *Boletus miniato-aurantiacus* Bi & Loh sp. nov. and *Boletus pseudo-parvulus* Bi sp. nov. Latin descriptions for these new species are in the text. All type specimens are deposited in the Herbarium of Institute of Microbiology of Province Guangdong (HMIGD).