

双胎妊娠合并急性脂肪肝1例

徐亚丽

■背景资料

妊娠期急性脂肪肝, 是妊娠晚期急性特发的严重并发症, 其发病率低, 起病急骤, 病情危重, 及早诊断, 合适治疗非常有必要。

徐亚丽, 成都中医药大学硕士研究生 四川省成都市 610075
通讯作者: 徐亚丽, 610075, 四川省成都市, 成都中医药大学
十二桥路校区学生二公寓405室, 535527xyl@163.com
电话: 028-66603457
收稿日期: 2007-11-29 修回日期: 2008-02-08

Twin pregnancy complicated with acute fatty liver

Ya-Li Xu

Ya-Li Xu, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610075, Sichuan Province, China
Correspondence to: Ya-Li Xu, Room 405, Student Apartment, Shierqiao Road School District, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610075, Sichuan Province, China. 535527xyl@163.com
Received: 2007-11-29 Revised: 2008-02-08

Abstract

Twin pregnancy complicated with acute fatty liver was found in a woman of thirty-one years old, and skin itching, digestive symptoms and jaundice were main manifestations. Acute fatty liver of pregnancy (AFLP) is usually severe and termination of pregnancy plays a key role in the treatment of AFLP. Early diagnosis and suitable treating method may result in a favorable prognosis.

Key Words: Acute fatty liver; Pregnancy; Diagnosis; Prognosis

Xu YL. Twin pregnancy complicated with acute fatty liver. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2008; 16(6): 680-681

摘要

双胎妊娠合并急性脂肪肝患者1例, 以皮肤黏膜搔痒、消化道症状及黄疸为表现, 起病急, 病情重, 及早终止妊娠是治疗AFLP的关键, 诊断及时, 治疗得当, 预后良好。

关键词: 急性脂肪肝; 妊娠; 诊断; 预后

■同行评议者

黄晓东, 副主任医师, 武汉市中心医院消化内科

徐亚丽. 双胎妊娠合并急性脂肪肝1例. 世界华人消化杂志 2008; 16(6): 680-681
<http://www.wjgnet.com/1009-3079/16/680.asp>

0 引言

妊娠期急性脂肪肝(acute fatty liver of pregnancy, AFLP)是妊娠晚期急性特发的严重并发症. 其发病率低, 起病急骤, 病情危重. 现报道1例AFLP, 结合文献加以讨论.

1 病例报告

患者曹某, 女, 31岁, 初产妇, 因停经34+5 wk, 呕吐4 d, 加重1 d于2007-09-14入院. 患者1个多月前出现皮肤黏膜搔痒, 双下肢水肿. 4 d前出现恶心, 呕吐, 今日呕吐加重, 呕出胃液带少量血丝. 既往否认肝炎结核等传染病史, 无外伤, 无药物食物过敏史. 入院查体: T: 36.6°C, P: 78次/分, R: 20次/分, BP: 108/68 mmHg, 神清合作, 皮肤巩膜轻度黄染, 心肺未见异常, 腹部膨隆, 肝脾未触及, 双肾区无扣痛, 双下肢无水肿. 辅助检查: 血常规未见异常. 肝肾功: 肌酐: 242.8 μmol/L, 尿素: 9.7 mmol/L, 血尿酸: 657 μmol/L, ALP: 902 U/L, AST: 386 U/L, ALT: 297 U/L, LDH: 774 U/L, TBIL: 175.5 μmol/L, DBIL: 91.4 μmol/L, Na⁺: 129.1 mmol/L, Mg²⁺: 2.07 mmol/L, 总蛋白: 57.1 g/L, 白蛋白: 27.7 g/L, 脂肪酶: 166 U/L, 淀粉酶: 44 U/L. 凝血全套: PT: 15.2 s, APTT: 43.6 s. B超提示: 宫内双活胎. 胎儿一头位, 一臀位. 左肝、胆囊、胰腺显示不清. 右肾轻度积水. 2007-09-14行急诊剖宫术, 难产两活婴, 体质量均为2000 g, APGAR评分分别为: 4分-5分-8分, 5分-7分-9分. 子宫内膜黄染. 术中出血约400 mL, 术后阴道流血累计约400 mL. 查血常规: WBC: 21×10⁹/L, N: 81%, HGB: 91 g/L, PLT: 67×10⁹/L. 多次查D二聚体阳性, 凝血全套: APTT: 17.7 s, APTT: 51.5 s, FIB: 0.5 g/L. 血氨: 8.1 mmol/L. 肝肾功: 尿素: 11.0 mmol/L, 肌酐: 128.0 mmol/L, ALB: 25.1 g/L, AST: 51 U/L, ALT: 28 U/L, LDH: 615 U/L, ALP: 257 U/L, TBA: 197.3 μmol/L, TBIL: 139.8 μmol/L, DBIL: 77.2 μmol/L. 甲肝、戊肝标志物为阴性, 输血全套为阴性. 尿常规: 尿胆原弱阳性, 胆红素(+), 隐血(+), 尿蛋白(+), WBC: 8-10/HP, RBC: 0-2/HP. 彩超提示: 脂肪肝.

胆囊壁水肿增厚声像。右肾轻度积水, 腹腔少量积液。CT示: 脂肪肝表现, 胰腺形态丰满, 腹腔少量积液, 胸腔少量积液。妊娠期合并急性脂肪肝诊断明确。治疗上给予输血小板、红细胞悬液、新鲜冰冻血浆、冷沉淀、白蛋白、维生素K1等。予补液、抗感染、保肝, 退黄、抑酸等对症支持治疗。经内科治疗, 患者恶心呕吐症状消失, 皮肤巩膜黄染消退, 复查肝肾功各项指标恢复正常出院。

2 讨论

本例的特点是头胎, 双胎, 男胎产妇, 发生在妊娠晚期, 起病急, 以皮肤黏膜瘙痒、消化道症状及黄疸为表现, 病情危重。

妊娠急性脂肪肝多发于妊娠中晚期, 孕32-38(平均在35)wk, 头胎妊娠, 双胎或多胎妊娠者且为男胎者容易发病。其发病机制尚不明确, 越来越多的研究表明AFLP与线粒体脂肪酸氧化功能障碍(fatty acide oxidation disorders, FAOD)有关^[1]。

AFLP临床表现可为疲乏不适, 头痛等不典

型表现, 病情发展迅速, 可出现恶心、呕吐、黄疸, 多部位出血, DIC, 肝肾衰竭、肝性脑病等表现。实验室特点是肝脏的合成功能异常: 低蛋白血症、弥散性血管内凝血、肝酶升高和白细胞计数升高; 肝脏的分泌功能异常: 高胆红素血症, 血尿素氮、肌酐和尿酸增加, 抗凝血酶III(ATIII)降低; 肝脏的代谢功能异常: 低血糖、高血氨和贫血。转氨酶通常是升高的^[2]。AFLP诊断主要依靠病史, 症状体征、实验室检查, 结合影像学检查。B超、CT影像学对诊断有一定的帮助, 也可做肝脏穿刺活检。诊断时需排除急性病毒性肝炎, 病史、血清肝炎病毒标志物等检查可协助鉴别诊断。

目前尚无特殊治疗, 及早终止妊娠是治疗AFLP的关键。一旦明确诊断, 应立即终止妊娠。内科治疗纠正凝血障碍, 保护脏器功能, 保肝等对症处理, 支持治疗, 处理并发症。

3 参考文献

- 1 王丽晖, 吴广礼. 妊娠急性脂肪肝最新研究进展. 中国急救医学 2006; 26: 689-691
- 2 杨孜. 妊娠急性脂肪肝的诊断和处理. 中国医刊 2003; 38: 12-13

■同行评价

妊娠急性脂肪肝多发于妊娠中晚期, 起病急, 病情重, 目前尚无特殊治疗, 及早终止妊娠是治疗AFLP的关键。一旦明确诊断, 应立即终止妊娠。因此, 及时诊断, 合适治疗非常有必要, 本文报道一例较典型病例, 并复习文献, 可加深读者对该病的认识。

编辑 程剑侠 电编 吴鹏朕

世界华人消化杂志在线办公系统

本刊讯 自2005-12-15起, 世界华人消化杂志正式开通了在线办公系统(<http://www.wjgnet.com/wcjd/ch/index.aspx>), 所有办公流程一律可以在线进行, 包括投稿、审稿、编辑、审读, 以及作者、读者、编者之间的信息反馈交流。凡在在线办公系统注册的用户, 将可获得世界华人消化杂志最新出版消息。