

两个角胡麻科的属在中国的分布

陶 德 定

(中国科学院昆明植物研究所)

关键词 角胡麻属, 长角胡麻属

Key words *Martynia*; *Proboscidea*

(一) 分属检索表

- 1 (2) 能育雄蕊 4。果实具有一枚角状弯勾、粗大, 长约10厘米, 腹缝线具有鳍状刺, 果实成熟时 2 瓣开裂
.....1. 长角胡麻属 *Proboscidea* Schnidel.
- 2 (1) 能育雄蕊 2。果实具有 2 枚极短的弯勾、细小, 长不足 6 毫米、腹缝线平滑, 无鳍状刺, 果实不开裂。
.....2. 角胡麻属 *Martynia* Linn.

(二) 标本记载及分布

长角胡麻属 *Proboscidea* Schnidel.

9 种, 产美洲温带。我国一种, 常见于北方栽培, 南方罕见。

长角胡麻

Proboscidea louisiana Wooton et Standley

产印度至墨西哥北部。我国常见于陕西西安及武功(武功农学院花卉区, 谢德 谔 220 号), 甘肃兰州, 河北北京(香山植物园, 崔友文 436 号); 云南昆明(昆明植物所, 植物园温室)。栽培供观赏。

角胡麻属 *Martynia* Linn.

1 种, 原产墨西哥及中美洲。现已在斯里兰卡、印度、越南、老挝、柬埔寨等地归化。中国云南南部及西南部首次记载。

角胡麻

Martynia annua Linn.

产墨西哥及中美洲, 印度、斯里兰卡、西巴基斯坦、尼泊尔、缅甸、越南、老挝、柬埔寨。我国首次在云南西南部(孟连、盈江、瑞丽)及南部记载。(瑞丽弄岛, 杨增宏 6938 号; 勐连调查队 10188 号; 勐腊勐崙植物园内栽培, 裴盛基 9031 号)。