

呼和浩特市鸟类种的新记录——珠颈斑鸠

A New Bird Record in Hohhot: Spotted Dove

Streptopelia chinensis

石春芳^{1,2,*}, 杨贵生²

SHI Chun-fang^{1,2,*}, YANG Gui-sheng²

(1. 内蒙古科技大学 生物与化学工程学院, 内蒙古 包头 014010; 2. 内蒙古大学 生命科学学院, 内蒙古 呼和浩特 010021)

(1. Inner Mongolia University of Science & Technology College of Biological & Chemical Engineering, Baotou 014010, China;

2. Inner Mongolia University College of Life Sciences, Hohhot 010021, China)

关键词: 珠颈斑鸠; 鸟类新记录; 呼和浩特市

Key words: *Streptopelia chinensis*; Bird new record; Hohhot

中图分类号: Q959.7 文献标识码: A 文章编号: 0254-5853 (2006) 06-0656-01

2004年4月4日笔者在呼和浩特市第三苗圃(40°48.445'N, 111°433.49'E)进行鸟类资源调查时,于15:40左右在东侧靠近东墙的灌丛中发现两只体长约30cm的类似灰斑鸠的鸟,在距其约8m的地方,通过8×40倍双目望远镜观察发现:通体粉褐色,头部灰褐色;后颈具宽阔的黑色领圈,其上杂以珍珠状白色斑点;上体羽淡褐色;下体羽葡萄灰色;飞羽黑褐色;尾略显长,外侧尾羽前端的白色甚宽;飞羽较体羽色深;虹膜橘黄;嘴黑色;脚红色。在观察过程中鸣叫4次,其叫声为声调较低的、反复的“咕咕-咕咕”的声音。根据其形态和声音,查阅马敬能·约翰等所著《中国鸟类野外手册》(Mackinnon et al, 2000),确定该鸟为

珠颈斑鸠(*Streptopelia chinensis*)。

2004年4月7日和10月26日,笔者在呼和浩特市第三苗圃内再次先后发现2只和5只珠颈斑鸠,同年10月27日8:20左右在植物园发现16只珠颈斑鸠,并以数码相机拍摄照片数张作取证记录。据一年观察,珠颈斑鸠在呼和浩特市区的活动范围主要集中在市第三苗圃和植物园院内的乔木、矮树、灌丛中。

依Yang & Xing(1998)所著《内蒙古脊椎动物名录及分布》记载,珠颈斑鸠在我国分布于华中、西南、华南及华东各地开阔的低地及村庄。此次观察到的珠颈斑鸠,其分布范围向北扩至40°52'N,为呼和浩特市鸟类分布新记录。

参考文献:

Mackinnon J, Phillipps K, He FQ. 2000. A Field Guide to the Birds of china [M]. Changsha: Hunan Education Press. [马敬能·约翰, 菲利普斯·卡伦, 何芬奇. 2000. 中国鸟类野外手册. 长沙: 湖南教育出版社.]

Yang GS, Xing LL. 1998. Distribution and Checklist of Vertebrate Species in Inner Mongolia [M]. Huhhot: Inner Mongolia University Press. [杨贵生, 邢莲莲. 1998. 内蒙古脊椎动物名录及分布. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社.]

* 收稿日期: 2006-10-17; 接受日期: 2006-11-07

* 通讯作者 (Corresponding author), E-mail: chunfang@imust.cn

第一作者简介: 石春芳 (1978-), 女, 讲师, 理学硕士, 研究方向为动物生态学。