

Erzurum, Erzincan, Artvin ve Kars İlleri Buprestidae (Coleoptera) Familyası Türleri Üzerinde Faunistik ve Taksonomik Çalışmalar I. Acmaeoderinae, Polycestinae ve Buprestinae*

Göksel TOZLU, Hikmet ÖZBEK
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum-TÜRKİYE

Geliş Tarihi: 16.03.1999

Özet: Artvin (Merkez, Ardanuç, Borçka, Hopa, Şavşat ve Yusufeli), Erzincan (Merkez, Tercan ve Üzümlü), Erzurum (Merkez, Aşkale, Çat, Horasan, İlica, İspir, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tortum ve Uzundere) ve Kars (Digor ve Sarıkamış) İlleri Buprestidae (Coleoptera) familyası türleri üzerinde 1993-1997 yıllarında yapılan bu araştırmada, Acmaeoderinae altfamilyasından 12, Polycestinae altfamilyasından 1 ve Buprestinae altfamilyasından 33 olmak üzere toplam 46 tür ve alttür saptanmıştır. Bunlardan, *Acmaeodera* (s.str.) *transcaucasica* Semenov, *Dicerca* (s.str.) *chlorostigma* Mannerheim, *Anthaxia* (*Haplanthaxia*) *truncata* Abeille de Perrin türleri ile *Acmaeoderella* (*Carininota*) *flavofasciata* *ablifrons* (Abeille de Perrin) alttüre Türkiye faunası için yeni kayittır. *Acmaeoderella* (*Euacmaeoderella*) *villosula* (Steven), *Anthaxia* (*Haplanthaxia*) *cichorii* (Olivier), *A.* (s.str.) *muliebris* Obenberger ve *A.* (s.str.) *nigricollis* Abeille de Perrin türleri ile *Melanophila picta decastigma* (Fabricius) alttüre yörende yaygın olan türlerdir. Diğer taraftan, *Anthaxia cichorii* ve *M. picta decastigma* ile *Acmaeoderella* (*Carininota*) *flavofasciata* (Piller & Mitterpacher), *A.* (C.) *flavofasciata* *albifrons*, *A.* (C.) *mimonti* (Boieldieu), *Anthaxia* (*H.*) *millefolii* (Fabricius), *A.* (*Melanthaxia*) *nigrojubata* *nigrojubata* Roubal ve *A.* (*M.*) *nigrojubata* *incognita* Bily diğer türlere oranla daha fazla yoğunluk oluşturmaktadır.

Çalışma alanındaki Buprestidae familyasının altfamilya, tribus, cins ve tür tanı anahtarları hazırlanmış, her türün taksonomik öneme sahip vücut kısımları çizilmiş, bulundukları yerler, bazılarının konukçuları, kimilerinin de üzerinden toplandıkları bitkiler ile Türkiye ve dünyadaki yayılışları verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Buprestidae, Faunistik, Taksonomik, Türkiye.

Faunistic and Taxonomic Studies on the Family Buprestidae (Coleoptera) in Erzurum, Erzincan, Artvin and Kars Provinces I. Acmaeoderinae, Polycestinae and Buprestinae

Abstract: A faunal and taxonomic study on the family Buprestidae (Coleoptera) was conducted in the provinces of Artvin (Central, Ardanuç, Borçka, Hopa, Şavşat and Yusufeli), Erzincan (Central, Tercan and Üzümlü), Erzurum (Central, Aşkale, Çat, Horasan, İlica, İspir, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tortum and Uzundere) and Kars (Digor and Sarıkamış) in 1993-1997.

A total of 46 species and subspecies were recorded belonging to 3 subfamilies, namely Acmaeoderinae (12 species), Polycestinae (1) and Buprestinae (33). Of these taxa, *Acmaeodera* (s.str.) *transcaucasica* Semenov, *Dicerca* (s.str.) *chlorostigma* Mannerheim, *Anthaxia* (*Haplanthaxia*) *truncata* Abeille de Perrin and *Acmaeoderella* (*Carininota*) *flavofasciata* *ablifrons* (Abeille de Perrin) are new records for the Turkish fauna. *Acmaeoderella* (*Euacmaeoderella*) *villosula* (Steven), *Anthaxia* (*Haplanthaxia*) *cichorii* (Olivier), *A.* (s.str.) *muliebris* Obenberger, *A.* (s.str.) *nigricollis* Abeille de Perrin and *Melanophila picta decastigma* (Fabricius) were widespread species throughout the region. Moreover, *Anthaxia cichorii*, *M. picta decastigma*, *Acmaeoderella* (*Carininota*) *flavofasciata* (Piller & Mitterpacher), *A.* (C.) *albifrons*, *A.* (C.) *mimonti* (Boieldieu), *Anthaxia* (*H.*) *millefolii* (Fabricius), *A.* (*Melanthaxia*) *nigrojubata* *nigrojubata* Roubal and *A.* (*M.*) *nigrojubata* *incognita* Bily were more abundant than the others.

Keys to the subfamilies, tribes, genera and species were prepared as well as the body parts of taxonomic importance being illustrated. Furthermore, the distribution of these species in Turkey and the world was given. Host plants of some species were recorded and plant species from which insect samples collected were also included.

Key Words: Buprestidae, Faunistic, Taxonomic, Turkey.

* Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonunca 1993/27 (M) Nolu Proje ile Desteklenen Doktora tezinin bir bölümündür.

Giriş

Buprestidae, Coleoptera takımının Polyphaga alttakımının tür bakımından zengin familyalarından birisidir (1, 2, 3). Tür sayısı konusundaki tahminler değişik olmakta, Richards ve Davies (1) 11 500, Bily (4) 12 000, Booth ve ark. (3) 15 000, Obenberger (5) ile Lodos ve Tezcan (6) ise 16 000 olduğunu belirtmektedirler. Obenberger (5) Palearktik Bölge'de 2 200, Bily (4) ise 1 500 civarında tür bulunduğu, bunların da çoğunun Akdeniz çevresi, Ortadoğu ve Avrupa'da yer aldığı vurgulamaktadır.

Buprestidae familyasına ait böceklerle Berker (7) tarafından "Müzeyyen Böceklerin Familyası" adı verilmiş, ancak daha sonraları "Süslüböcekler, Parlak Kırkantılılar, Yassıbaş Böcekleri, Yassıbaşlar, Ağaçoyan Yassıbaşlı Böcekler" gibi isimler kullanılmış, bunlardan şimdilik kabul görmüş olanı "Süslüböcekler" olmuştur (8).

Erginler, güneşli havalarda aktiftirler, özellikle bitkilerin çiçeklerinde polenle beslenirlerse de yaprak, sürgün ve tomurcuklarla beslenenler de vardır. Çoğu türlerin larvaları, orman, park ağaçları ve çalıları ile meye ağaçlarının kabuk dokusunda beslenerek enine kesiti oval olan galeriler açarlar. Özellikle, zayıf, ölmekte olan veya ölmüş ağaçlara saldırırlar. Erginler, yumurtalarını bu tip ağaçların kabuk çatlakları arasında bırakırlar. Birçok tür, ekonomik zararlara sebep olmaktadır (1, 2, 6, 9). Kimi türler ise başta baklagıl bitkileri olmak üzere, bazı otsu kültür ve yabani bitkilerin sap ve köklerinde beslenirler. Bu nedenle, bazı kültür bitkilerinde zararlı olurken, kimi yabancı otları da baskı altında tutarlar. Nitekim, *Sphenoptera* ile *Agrilus* cinslerine mensup bazı türler, yabancı otlarla biyolojik mücadelede kullanılmaktadır (6, 10, 11).

Buprestidae familyası türleri, genellikle yılda 1 döl verirler. Fakat, larva döneminin bazı türlerde uzun sürmesi nedeniyle, birkaç yılda bir döl veren türler de vardır. Örneğin, *Buprestis cupressi* Germar 3 yılda 1 döl verirken (12), *Capnodis miliaris* (Klug) ve *Chrysobothris affinis* (F.) gibi türler 2 yılda 1 döl vermektedir (6, 12). Yine, Schimitschek (13), buprestidlerin Orta Avrupa ormanlarında 2 yılda 1 döl verdiği, *Agrilus* türlerinin İstanbul çevresinde yılda 1 döl, *Anthaxia* türlerinin Güney Anadolu'da yine yılda 1 döl verdiği bildirmektedir. Diğer taraftan, Bily (4), *Chalcophora mariana* (L.)'nın gelişmesini 3-6 yılda tamamlandığını belirtmektedir.

Buprestidae familyası türlerinin çoğu, sekonder zararlı durumundadır, fakat fazla miktarda çoğaldıkları ve isteklerine uygun yeteri kadar besin kaynağı bulamadıkları zaman, primer zararlı durumuna geçer ve ağaçlara çok fazla zarar verirler. Bu nedenle, ormancılıkta Buprestidae

familyası zararlı birçok türleri içine alan önemli bir familya olarak kabul edilmektedir (14).

Buprestis ve *Dicerca* cinslerinin bazı türleri ile *C. mariana* türünün, İskandinav ülkelerinde, potansiyel odun zararlısı olarak büyük önem taşıdığı, *Scintillatrix rutilans* (F.)'ın, zaman zaman yaşlı *Tilia cordata* ağaçlarında, *Agrilus aurichalceus* Redtenbacher'un ise kültüre alınmış *Rosa* türlerinde çok önemli zararlı durumunda olduğu belirtilmektedir (4). Aynı araştırmacı, yoğunluk fazla olduğunda *Trachys minutus* (L.) larvalarının *Salix caprea* ağaçlarının yapraklarında % 50'den fazla zarar oluşturduğunu ve bir yaprakta 1-4 arasında larvanın bulunduğu vurgulamaktadır (4). Ayrıca, *Agrilus biguttatus* Rossi'un Almanya'nın kuzeyinde meşe ağaçlarında önemli düzeyde zarara yol açtığı kaydedilmektedir (15).

Türkiye'de, son yıllarda, Buprestidae türlerinin yaptığı zararlarla ilgili olarak çiftçilerimizin şikayetleri gündeme gelmeye başlamıştır. Özellikle, *Capnodis* ve *Coræbus* gibi cinsler içinde yer alan türlerin larvaları, canlı dokularda gelişerek, kültürü yapılan pek çok ağaçta, orman ve süs bitkisi ağaç ve ağaççıklarında önemli zararlar yapmaktadır (16, 17).

Türkiye'de Buprestidae familyası türleri üzerinde yapılan faunistik ve sistematik çalışmalar, 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Ancak, bu çalışmalar, genellikle yabancı araştırmacılar tarafından kısa süreli inceleme gezileri sırasında toplanan örneklerin ve yapılan gözlemlerin bildirilmesi şeklinde olmuştur. Bunlar arasında, Fairmaire (18, 19), Bodemeyer (20), Sahlberg (21), de Kerville (22), Schimitschek (13), Obenberger (23), Bodenheimer (24), Chararas (25), Bily (26, 27), Bily ve Brodsky (28), Curletti (29), Curletti ve Magnani (30, 31), Novak (32, 33, 34), Levey (35), Niehuis (36, 37, 38, 39, 40) ve Svoboda (41)'nın çalışmaları örnek olarak verilebilir. Bunun yanında, yerli araştırmacıdan, Acatay (42, 43, 44), Erdem (45, 46), Erkiliç ve Sümer (47), Defne (48), İleri ve Ayfer (49), Çanakçıoğlu (14, 50, 51), Nizamlioğlu (52), Alkan (53), Tuatay (54), Nizamlioğlu ve Gökmen (55), Yüksel (56), Karagöz ve Sekendiz (57), Özer ve Duran (58), Beşçeli (59), Ural vd. (60), Sekendiz ve Yıldız (61, 62), Sekendiz (12, 63), Yıldız (64), Akman ve San (65), Tosun (66), Çanakçıoğlu vd. (67), Güler (68), Kornoşor (69), Maçan (70), Yücel (71), Toros (72), Güler ve Can (73), Özbek vd. (74), Uygun vd. (75) ile Özoğlu ve Uygun (76)'un belirli türlerle ilgili bazı gözlemleri olmuştur.

Winkler (77), Türkiye'de bulunan buprestid'lerin tür sayısını 22 cinse bağlı 104 tür, Obenberger (78, 79, 80, 81, 82, 83, 84) ise 31 cinse bağlı 239 tür olarak

vermektedir. Bu araştırmacıların hazırladıkları kataloglar, sonraki araştırmalar için değerli bir envanter olmuştur. Türkiye'de bu familya türleri üzerinde yapılan faunistik ve sistematik çalışmalar 1990'lı yıllarda sonra artmaya başlamıştır. Niehuis (85, 86), Türkiye'den *Buprestis* ve *Coraebus* cinsine mensup türler üzerinde çalışmış, *Buprestis* cinsine mensup 13 tür ile *Coraebus* cinsine mensup 5 türün tanrı anahtarlarını hazırlayarak, bunların şekillerini ve bazı türlerin yayılış alanlarını haritalar üzerinde göstermiştir.

Tezcan (16), Buprestidae familyası türleri üzerinde İzmir'de yaptığı çalışmada, Buprestinae altfamilyasına mensup 19 tür tespit etmiş, bunların sinonim ve tanımları ile dünyadaki ve Türkiye'deki yayılışlarını vermiş, konukçuları ile üzerinden topladığı bitkileri belirtmiş, bu türlerden ikisinin ülkemiz faunası için yeni kayıt olduğunu bildirmiştir. Aynı araştırmacı bir diğer çalışmasında 7 altfamilyadan 12 cinse ait 35 tür tespit etmiş, bunlardan üçünün ülkemiz faunası için yeni kayıt olduğunu belirtmiştir (87).

Lodos ve Tezcan (88), Türkiye Buprestidae faunasını zoocoğrafik yönden değerlendirdikleri çalışmalarında, 35 cinse ait 91'i endemik olmak üzere 386 türün bulunduğuunu belirtmişlerdir. Niehuis ve Tezcan (89), *Agrilus* cinsine mensup 37 türün üzerinden toplandıkları bitkileri belirterek, bunların yayılış alanlarını haritalar üzerinde göstermişlerdir. Ayrıca, bazı türlerin yeni sinonimleri ile *Agrilus buresi* Obenberger türünün taksonomik durumunu yeniden düzenlemiştir. Lodos ve Tezcan (6), 15 cinse mensup çok sayıdaki Buprestidae familyası türünün sinonimlerini, tanımlarını ve dünya ile Türkiye'deki yayılışlarını belirterek, konukçuları ile zarar şekilleri hakkında bilgiler vermişlerdir. Tezcan (90, 91, 92), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Müzesi'ndeki uzun yıllardan bu yana değişik yerlerden toplanmış örnekler üzerinde yaptığı çalışmalarında, *Acmaeoderinae* altfamilyasına mensup, *Acmaeodera* ve *Acmaeoderella* cinslerinden 10'ar, *Chalcophorinae* altfamilyasına mensup, *Capnodis* cinsinden 6, *Chalcophora*, *Chalcophorella* ve *Stigmatophorella* cinslerinden ise 1'er türü ele almış, her türün yayılışı, toplandığı yer ve üzerinden toplandığı bitkileri belirterek, önceki literatür ışığında Türkiye'deki yayılışlarını haritalarla vermiştir. Kismalı vd. (93), Buprestidae ve Chrysomelidae familyalarına mensup türlerin GAP Bölgesi'ndeki durumunu inceledikleri çalışmalarında, 7 altfamilyaya mensup 55 buprestid türünün yöredeki yayılış alanlarını literatür ve materyal bilgilerine dayalı olarak bildirmiştir.

Yukarıda belirtilen literatür bilgilerinden ülkemizin diğer yörelerinde Buprestidae ile ilgili bazı çalışmalar

yapılmış olmasına karşın Doğu Anadolu'da bu familya üzerinde yapılmış çalışmaların yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu nedenle böyle bir çalışma ele alınmış, Erzurum, Erzincan, Artvin ve Kars illerindeki buprestid türlerinin tespitine çalışılarak, altfamilya, tribus, cins ve tür tanrı anahtarları hazırlanmış, teşiste önem taşıyan vücut kısımları çizilmiştir. Ayrıca, türlerin dünya ve Türkiye'deki yayılışları, yörede bulunduğu yerler ve üzerinden toplandıkları bitkiler ile bazı türlerin konukçuları tespit edilmiştir.

Materyal ve Metot

Araştırmayı materyalini, Artvin'in Merkez, Ardanuç, Borçka, Hopa, Şavşat ve Yusufeli; Erzincan'ın Merkez, Tercan ve Üzungöl; Erzurum'un Merkez, Aşkale, Çat, Horasan, İlaca, İspir, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tortum ve Uzundere; Kars'ın Digor ve Sarıkamış ilçelerinden toplanan Buprestidae familyasına bağlı türlere ait örnekler oluşturmaktadır. Ayrıca, daha önceki yıllarda yöreden toplanmış az sayıdaki örnekler de çalışmaya dahil edilmiştir.

Örnekler, 1993-1997 yıllarının Mayıs-Ekim aylarında, yukarıda sayılan her bir ilçeye ve ulaşım imkanlarının elverdiği ölçüde bunların bazı köylerine 2 veya 3 kez gidilerek, kültür bitkileri, yabancı otlar, tarıma açılmamış alanlar ile orman alanlarından bitkilerin farklı fenolojik dönemlerinde toplanmıştır. Alçak boylu kültür bitkileriyle, yabancı otlar üzerinden atrap sallanarak, ağaç ve çalılardan ise bir elle atrap torbası veya japon şemsiyesi dallarına tutulup, diğer elle hızla dallara vurulmak suretiyle materyal toplanmıştır. Bitkilerin kabuk altı ve gövde içeri, yine bazı bitkilerin de kök kısımları incelenerek, buradaki ergin ve larvalar alınmış, böceklerin üzerinden toplandığı bitkilerle birlikte laboratuvara getirilmiştir.

Buprestinae altfamilyası içerisinde yer alan *Anthaxia* cinsi türlerinin teşhisinde büyük önem arzeden erkek genital organları bir bistüri yardımıyla çıkarılmış ve kısa bir süre % 10'luk potasyum hidroksit içerisinde kaynatılmış ve sonra gliserin içerisine aktarılarak, stereomikroskop altında kasları temizlenmiş ve teşiste önem taşıyan paramere ve aedeagus gibi kısımlar çizime hazır hale getirilmiştir. Teşiste önem taşıyan vücut kısımları ile genital organların çizimleri "Wild MSA" marka stereomikroskoba takılan çizim tüpü yardımıyla yapılmıştır.

Türlerin teşhisinde, Thery (94), Richter (95, 96), Schaefer (97) ve Bily (4, 98)'nın hazırladıkları anahtarlardan yararlanılmıştır. Teşhis yapılamayan örneklerin teşhis ile teşhis edilen örneklerin kontrolü Dr.

Svatopluk Bily (Çek Cumhuriyeti) ve Dr. Mark G. Volkovitsh (Rusya) tarafından yapılmıştır. Böceklerin üzerinden toplandıkları yabancı otların teşhisleri Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Zengin (Erzurum), ağaç ve çalı formundaki bitkilerin teşhisleri ise Yrd. Doç. Dr. Hasan Yılmaz (Erzurum) tarafından yapılmıştır. Altfamilya, tribus ve cinsler Bily (98)'ye göre, tür isimleri ise her altfamilya içerisinde yer alan altcinslere göre alfabetik sırayla verilmiştir.

Tanı anahtarlarının hazırlanmasında yer yer Bily (4) ve Tezcan (16)'dan yararlanılmışsa da bizzat örneklerin karakterleri incelenerek anahtarlar oluşturulmuştur.

Bulgular

Erzurum, Erzincan, Artvin ve Kars illerinde, Acmaeoderinae altfamilyasından 12, Polycestinae altfamilyasından 1, Buprestinae altfamilyasından 33, Sphenopterinae altfamilyasından 7, Chalcophorinae altfamilyasından 8, Chrysobothrinae altfamilyasından 3, Agrilinae altfamilyasından 17, Cylindromorphinae altfamilyasından 2 ve Trachyinae altfamilyasından 1

olmak üzere 9 altfamilyaya bağlı toplam 84 tür ve alttür bulunmuştur. Bu birinci bölümde Acmaeoderinae, Polycestinae ve Buprestinae altfamilyaları ele alınmış ve bunlara bağlı 46 tür ve alttür incelenmiştir.


Buprestidae Familyasına Bağlı Altfamilyaların Tanı Anahtarı

1- Vücut üçgen veya üçgenimsi şekilde (Şekil 1.1); frons'ta clypeal dikişin üzerinde nokta şeklinde derin çukurcular var (Şekil 1.2); pronotum'un genişliği uzunluğunun en az 3 katı TRACHYINAE

- Vücut uzunca, oval veya hemen hemen silindirik; frons'ta clypeal dikişin üzerinde nokta şeklinde derin çukurcular yok, pronotum'un genişliği uzunluğunun en çok 2, 5 katı veya uzunluğu genişliğinden daha fazla 2

2- Ön tibiae'nin ucu 1 dikenli (Şekil 1.3); scutellum'un ucunda diken şeklinde uzantı var (Şekil 1.5) SPHENOPTERINAE

- Ön tibiae'nin ucu 2 dikenli (Şekil 1.4); scutellum'un ucu dikensiz 3



Şekil 1. *Trachys minutus* (L.)'da vücut genel görünümü, 2. *T. minutus*'da frons'taki çukurlar, 3-4. Ön tibia'daki diken, 3. *Sphenoptera* (s.str.) *antiqua* (Illiger), 4. *Acmaeoderella* (*Carinifera*) *flavofasciata* (Piller & Mitterpacher), 5. *S. antiqua*'da scutellum, 6. *Cylindromorphus filum* (Gyllenhal)'da pronotum, 7-8. Prosternum yapıları, 7. *Buprestis rustica* Linnaeus, 8. *Acmaeodera* *degener* (Scopoli), 9-10. Ön femur'daki diken, 9. *Chrysobothris* *chrysostigma* (L.), 10. *Aurigena cuprata* (Klug), 11-12. Anten, 11. *Chrysobothris* *affinis* (F.), 12. *Acmaeoderella* (*Euacmaeoderella*) *safavii* Volkovitsh, 13-14. Anten segmentleri üzerindeki duyu porlarının durumu, 13. *Ptosima* *flavoguttata* (Illiger), 14. *A. degener* (2. 7. 8. 13. 14. (98)'den).

- 3- Pronotum silindirik ve boyun şeklinde uzar (Şekil 1.6) CYLINDROMORPHINAE
- Pronotum daha geniş ve boyun şeklinde uzamaz .. 4
- 4- Mesosternum, prosternum tarafından tamamen ikiye bölünür (Şekil 1.7) 5
- Mesosternum, prosternum tarafından ikiye bölünmez (Şekil 1.8) 8
- 5- Mesosternum küçülmüş, hemen hemen belirsiz; arka coxae dışa doğru belirgin bir şekilde genişler; tırnaklar dişli; vücut oldukça uzun, hemen hemen silindirik ve posteriore doğru sivri; elytra'nın uzunluğu genişliğinin 2,5 katından daha fazla AGRILINAE
- Mesosternum iyi gelişmiş; arka coxae femur'a bağlılığı yerde en geniş; tırnaklar dişsiz; vücut genellikle oval ve yassı; elytra'nın uzunluğu genişliğinin en fazla 2,5 katı 6
- 6- Ön femora anterior yüzeyde büyük bir diken taşırlı (Şekil 1.9); kanadın radial hücreleri azalmış; antene ait skleritler frons'tan alçak bir tümsekle ayrırlı; 3. anten segmenti 4. segmentten en az 2 kat daha uzun (Şekil 1.11); gözler dorsalde birbirine yaklaşır; vertex oldukça dar; her bir elytron'da 3 tane altın yeşili çukur var CHRYSOBOTHRINAE
- Ön femora anterior yüzeyde diken taşımaz (Şekil 1.10); kanadın radial hücreleri iyi gelişmiş; antene ait skleritler frons'tan herhangi bir tümsekle ayrılmaz; 3. anten segmenti 4. segmentten daha kısa (Şekil 1.12); gözler dorsalde birbirine yaklaşmaz; vertex daha geniş; elytra üzerinde altın yeşili çukurlar yok 7
- 7- Duyu porları genişlemiş olan 5.-11. anten segmentleri yüzeyinde dağılmış; scutellum çok küçük ve hemen hemen belirsiz; pronotum'un posterior kenarları hemen hemen düz; elytra daima sıralı çukurculuklara ihtiyaç etmez, fakat uzunlamasına parlak kabartılı alanlar bulunur; boyları 20 mm'den daha fazla CHALCOPHORINAE
- Duyu porları genişlemiş olan 5.-11. anten segmentleri üzerinde bulunan duyu pitleri içerisinde toplanmış; scutellum büyük ve genellikle üçgen veya pentagonal; pronotum'un posterior kenarları hemen hemen yılankavı; elytra genellikle uzunlamasına sıralar halinde çukurculuk, uzunlamasına parlak kabartılı alan daima bulunmaz; boyları 20 mm'den daha küçük BUPRESTINAE
- 8- Duyu porları anten segmentlerinin üç kısımlarında yer alır (Şekil 1.13) POLYCESTINAE
- Duyu porları anten segmentlerinin yüzeyine dağılmış (Şekil 1.14) ACMAEODERINAE

ACMAEODERINAE Kerremans, 1893

Acmaeoderini

Acmaeoderini Tribus'u Bağlı Cinslerin Tanı Anahtarı

- Vücut yaprak şeklinde kıl ve tüylerle kaplı; clypeus çok dar, anteriorde hafif kavisli veya düz (Şekil 2.1); elytral epipleura subhumeral kısmında içe doğru yarıklı (Şekil 2.2) Acmaeoderella

- Vücut seta şeklinde kıl ve tüylerle kaplı; clypeus normal, anteriorde derin yarıklı (Şekil 2.3); elytral epipleura subhumeral kısmında düz (Şekil 2.4) Acmaeodera

Acmaeodera Eschscholtz, 1829

Tip Tür: *Buprestis cylindrica* Fabricius, 1775 (99)Sinonim: *Andromeda* Gistel, 1834; *Sternoxus* Billberg teste Mannerheim, 1837; *Ptychomus* Marseul, 1865 (78, 100).

Acmaeodera Cinsine Bağlı Türlerin Tanı Anahtarı

- Elytra üzerinde enine çok sayıda düzensiz şekilli bantlar ile az sayıda boyuna uzanan kısa bantlar bulunur (Şekil 3.1); erkekte 5.-10. anten segmentlerinin uçları daha küt (Şekil 3.4), anal sternit'in uc kısmı yuvarlak (Şekil 3.7) A. (s.str.) *transcaucasica*


- Elytra üzerinde boyuna uzanan bantlar (Şekil 3. 2, 3) ile birbirinden ayrı noktaların oluşturduğu hatlar bulunur; erkekte 5.-10. anten segmentlerinin uçları sıvırı (Şekil 3. 5), anal sternit'in uc kısmı düz (Şekil 3. 6) A. (s.str.) *flavolineata*

Acmaeodera (s.str.) *flavolineata* Lepori & Gory, 1835Sinonim: -*albolineata* Gyllenhal, 1838; -*sticta* Gyllenhal, 1840; -*bivittata* Gyllenhal, 1912; -*lineata* Oberthür, 1926; *transcaucasica flavolineata* Obenberger, 1934 (1).

Dünya'daki Yerlisi: Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, İraq, Lübnan, Türkiye, Ürdün ve Yemenn (Tuncer, 1978, 2002, 2004).

Türkiye'deki Yerlisi: Bartın (Çoruh), Kırıkkale (Topraktepe), Bingöl (Bugrahan), Çankırı (Çamlıhan), Gaziantep, Hatay (Musa Dağı), İçel (İçel), Kırşehir (Kül Geçidi, Tarsus), İzmir (Bornova, Selçuk) ve Muğla (Marmaris) (Tuncer, 1993-104).

İncelenen Material: A. (s.str.) *transcaucasica* 7.7.1994, 1 ♂, 1 ♀, 200 m, Ardanuç, Çarsu, 670 m; Şavşat 17.6.1994, 1 ♂, 120 m, Demirkent, 5.7.1994, 1 ♂, 1 ♀, 200 m, Ardanuç, 6.19.1994, 1 ♂, 1 ♀, 100 m, Demirkent 6.7.1994, 1 ♂, 45 m, Sarıgöl, 1 ♂, 700 m (Toplam örnek sayısı: 9). Örnekler *Achillea biebersteinii*, *A. millefolium* ve *Anthemis tinctoria* üzerinden toplanmıştır.



Şekil 2. *Acmaeoderella* cinsine bağlı türlerde 1. clypeus, 2. elytral epipleura. *Acmaeodera* cinsine bağlı türlerde 3. clypeus, 4. elytral epipleura

Şekil 3. 1-2. Vücutun genel görünümü. 1. *Acmaeodera* (s.str.) *transcaucasica* Semenov, 2. *A.* (s.str.) *flavolineata* Laporte & Gory; 3. *A.* (s.str.) *flavolineata* daki bantlar, 4-5 mm. 4. *A.* (s.str.) *transcaucasica*; 5. *A.* (s.str.) *flavolineata*; 6. Anal sternit. 6. *A.* (s.str.) *flavolineata* (), 7. *A.* (s.str.) *transcaucasica* () (Ölçek 1 mm).

Acmaeodera (s.str) *transcaucasica* Semenov, 1895

Dünyadaki Yayılışı: Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan (78, 103).

Türkiye'deki Yayılışı: Türkiye fasonası için veni kayıttır.

İncelenen Materyal: ARTVIN (Yusufeli-Demirkent 6.7.1994, 1 , 450 m). İncelenen tek erkek birey *Anthemis tinctoria* üzerinden yakalanmıştır.

Acmaeoderella Cobos, 1955

Tip tür: *Buprestis discoidea* Fabricius, 1787

Acmaeoderella Cinsinin Altcins, Tür ve Alttürlerinin Tanı Anahtarı

1- Pronotum'un posteriorü iki adet belirgin çukurcuk taşırlar (Altcins: *Carinonota*) 2

- Pronotum'un posteriorü çukurcuk taşımaz (Altcins: *Liogastria*) 3

2- Vertex, pronotal disk ve elytra'nın öndeği 1/3'lük kısmı dar yaprak şeklinde, kahverengi ve beyaz renkli karışık killarla kaplı; vücut silindirik; pronotum anterior köşelerde genişlemez; elytra tamamen belirgin çizgiler taşırlar, üzerini kaplayan killar dar yaprak şeklinde; elytral epipleura subhumeral kısmında içe doğru hafif yarıklı (Şekil 4.7) *A. flavofasciata flavofasciata*


- Vertex, pronotal disk ve elytra'nın öndeği 1/3'lük kısmı kahverengi kıl taşımaz, yaprak şeklinde beyaz renkli killarla kaplı; vücut kısmen tombul yapılı; pronotum anterior köşelerde genişler; elytra sadece anterior 1/3'lük kısmda belirgin çizgiler taşır, çok geniş yaprak şeklinde killarla kaplı; elytral epipleura subhumeral kısımda içe doğru daha derin yarıklı (Şekil 4.8) *A. mimonti*

3- Elytra boyuna uzanan sarı çizgiler taşır (Şekil 4.5), vücut mat kahverengimsi siyah renkte *A. chrysanthemi*

- Elytra boyuna uzanan sarı çizgiler taşımaz (Şekil 4.1, 2, 3, 4, 6), metalik bronz veya mavimsi renkte (Altincı: *Euacmaeoderella*) 4

4- Frons'un genişliği, göz çapı kadar veya çok az fazla; boy 4, 85-7, 45 mm; elytra kahverengimsi bronz renkte 5

- Frons'un genişliği, göz çapının 1,50-3,25 katı kadar; boy 6, 70-9, 80 mm; elytra kahverengimsi bronz renkte 6



Şekil 4.

- 1-6. Vücut genel görünümü: 1. *Acmaeoderella (E.) villosula* (Savile-Brown), 2. *(E.) obscura* (Menetries), 3. *(E.) gibbulosa* (Reitter), 4. *A. (E.) safa* (Volkov), 5. *A. (L.) chrysanthemi* (Chevrolat), 6. *(E.) obscura* (Ménétries); 7. *A. (E.) obscura* (Piller & Mittermeier), 8. *(C.) mimonti* (Piller & Mittermeier), 9. Anal sternit, 10. A. (E.) gibbulosa (Piller & Mittermeier), 11. *A. (E.) safa* (Volkov), 12. *(E.) gibbulosa* (Piller & Mittermeier), Anten, 13-16. Tarsal kollar, 17-21. Arka tarsus, 20. *A. (E.) villosula*, 21. *A. (E.) obscura* (Ölçek 1 mm).

7- Elytra mavimsi; erkekte anten 5. segmentten itibaren çok belirgin olarak genişlemiş (Şekil 4.18); arka tarsus'un 1. segmenti 2. segmentten çok az uzun (Şekil 4.20) *A. villosula*

- Elytra siyah; erkekte anten 4. segmentten itibaren genişler (Şekil 4.19); arka tarsus'un 1. segmenti 2. segmentin yaklaşık iki katı uzunlukta (Şekil 4.21)

..... A. obscura
Acmaeoderella (Carinonota) flavofasciata flavofasciata
 (Dill. S. Mitt., 1782)

Sinonim: *-taeniata* Fabricius, 1787; *-hirta* Villers, 1789; *-volvulus* Castelnau et Gory, 1835; *-flavofasciata persica* Mannerheim, 1837; *-flavofasciata hirsulata* Gory, 1840; *-tristis* Lucas, 1844; *-pladica* Baudi, 1870; *-unifasciata* Rey, 1890; *-flavofasciata impunctata* Abeille de Perrin, 1891; *-flavofasciata* [] *lis* Obenberger, 1914; *-dispersenotata* [] 103.

Dünyadaki Yayılmış Diller: Almanya, Arnavutluk, Astarye, Azerbaycan (Kuzey ve Güney Kısımları), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Eritre, Fas, Fransa, Gürcistan, İspanya, İsviçre, İtalya, Kazakistan (Batu Kıpırı), Macaristan, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Suriye, Türkiye, Uzakdoğu, Vatikan, Vatikana, Yunanistan (78.5%), Rusya (103.5%),

Türkiye'de Yayımlanmış
Bitlis (Şenşadiye, Nemrut
Çorum (Hatiçeşşas), Kırıkkale
(104, 105), Mardin (Mardin
ile Edirne (Edirne) ve Bilecik

İncelenen [REDACTED] türlerde [REDACTED] 900 m yükseklikte [REDACTED] 99,5% [REDACTED] 1,2 m, 600 m, Sıhhiye, Çiftlik, 2, 6.1996, [REDACTED] 6.1996, [REDACTED] 6.8.1996, [REDACTED] 24.8.1993, [REDACTED] 1700 m) (Toplam örnek sayısı: 37). Örnekler *Achillea biebersteinii*, *A. milleriolum*, *Anthemis arvensis* ve *A. tinctoria* üzerinden toplanmıştır.

Diğer tarafta Rize Çayırtı İlçesi (Erzurum) 17.7.1995 (2200 m; Anzavdere-Çoru (Erzurum) 17.7.1995 (2200 m; Çalyazı-Pasinler (Erzurum) 15.8.1995 (2200 m, 11.7.1996, 2200 m; 2200 m, 11.7.1996, 2200 m) elde edilmiştir. *C. flavofasciata albifrons* (Abeille de Perrin, 1891) olarak teşhis edilmişlerdir. Bu üç alttür dağılışları yönünden incelediğinde; *A. (C.) flavofasciata aequistriata*'nın diğerlerine oranla daha düşük rakımdaki Çoruh Vadisi'nin tabanında (Sebzeciler, 450 m) bulunduğu görülmektedir. Diğer iki alttürde ise lokasyon ve habitatlar birbirine çok benzemektedir. *A. (C.) flavofasciata flavofasciata* Demirkent-Yuşufeli (600 m)'nden Turnalı-Şenkaya (1700 m)'ya kadar olan lokasyonlarda, *A. (C.) flavofasciata albifrons* ise Anzavderesi-Oltu (950 m)'dan Çalyazı-Pasinler (2100 m) kadar yükselen lokasyonlarda

maeoderella (*Carinina*) *mimonti* (Boieldieu, 1838) - *arenicola* Sasaki, 1905; - *latisquammis* Berger, 1908.

[redacted] ünyadaki Yayılışı: Azerbaycan, Avrupa, Bulgaristan, Ermenistan, Doğu Akdeniz, Gürçistan, Irak, İran, İtalya, Kazakistan (Batı Kısmı), Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan, Romanya, Rusya (Avrupa Kısmı), Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Yugoslavya ve Yunanistan (103, 107, 108).

Türkiye'de	ursa ve	e ve
İncelenen Mysteria		b
2 , 3 , 185		5
20.6.1994		
m, 12.7.1996		, 1850
19.8.1997, 1		m, Palandöken
2300 m, 1.7.199		
2 , 2250 m,		2300
23.7.1997		Aşka
12.8.1996, 1 , 190	m; Uzund	Dikyar 10.7.1994,
1 , 1450 m) (Top	m örnek	yısı: 32). Örnekler
Achillea biebersteinii, Anthemis arvensis ve Eryngium		
billardieri üzerinden toplanmıştır.		

Acmaeoderella (*Euacmaeoderella*) *gibbulosa*
(Menetries, 1832)

Sinonim: *-inamoena* Faldermann, 1835; *-lugens* Gory, 1840; *-cuprinula* Reitter, 1890; *-tenuifrons* Obenberger, 1924; *-ledei* Obenberger, 1934; *-araxigena* Obenberger, 1940; *-pseudocuprinula* Obenberger, 1940 (103).

Dünyadaki devletler: Azerbaycan, Bulgaristan, Cin (Kuzey Çin Denizi), Belarus, Akdeniz, Emanastan, Gürcistan, İran, İsrail, Kazakistan, Kibris, Lübnan, Moğolistan, Rusya (Güney Avrupa Kismi), Suriye, Torkmenistan, Ürdün, Yugoslavya ve Yemanistan (78, 103, 108, 109).

İncelenen [redacted] İ: (Aşkale-Pınarlıban
9.8.1994, [redacted] Çengübayır 25.9.1995,
1 , 1850 m); KARAKÖY: Karaköy 6.1.1996,
2 , 2 , 162 m) (Tüm örneklerin kırılganlık sayısı: 6).
Örnekler Achillea biebersteinii üzerinden toplanmıştır.

Acmaeoderella (Euacmaeoderella) obscura (Reitter, 1889)

Sinonim: *-cyaniventris* Reitter, 1890; *-kalalae* Obenberger, 1935; *-nigroopaca* Cobos, 1963 (103).

Dünyadaki yayılışı: Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Türkiye ve Türkmenistan (78, 103, 104, 108).

Türkiye'deki yayılışı: Adana, Bingöl-Muş (Bugulan Gecidi). Diyarbakır, Hakkari (Sat Dağları). Hatay, Mardin.

Merckx, J., Van der Velde, G. (1981) *Gevel*, (103), 1-12.
len, M. (1981) *Lat. Amer. Stud.* 15, 121-125.
KARS: (1981) *Gevel*, 103, 1-12.
).
Ch. (1981) *Gevel*, 103, 1-12.
ot, R. (1981) *Gevel*, 103, 1-12.
maed, J. (1981) *Gevel*, 103, 1-12.
(EU) (1981) *Gevel*, 103, 1-12.
ella) s. S. Volkovitsh,
1981.

Dünyadaki yayılışı: İran ve
Irak (104, 109, 110).

Türkiye'deki Yayılışı: Bingöl (Buğlan Geçidi) ve Şanlıurfa (Ceylanpınar), (104)

İncelenen Materyal: ERZIN
5.7.1995, 2 , 2 , 1350
4). Örnekler *Althaea* sp. çiçekler
mlü-Ba
Topl. : Jisi:
erinden toplanmıştır.

Acmaeoderella (Euacmaeoderella) vetusta (Menetries, 1832)

Sinonim: *-cuprifera* Castelnau et Gory, 1835; *-producta* Castenau et Gory, 1835; *-olivacea* Abeille de Perrin, 1904 (103).

Dünyadaki yayılışı: Azerbaycan (Doğu Kümesi),
Bulgaristan, Doğu Akdeniz, Ermenistan, Gürcistan, İran,
İsrail, Kıbrıs, Lübnan, Rusya, Suriye, Türkiye,
Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan (102, 103, 107,
108)).

Tüm yedekleri ve depremdeki yayılışları: Adana, Amasya, Aksaray (Baraj), Diyarbakır (Ergani), Erzurum, Gaziantep (Çayırcık), Hakkâri (Şemdinli), Hatay (Kâssâ-Akbez), İçel (Elazığ), İzmir, Kahramanmaraş (Andırın, Nurhak Dağı), Türkoğlu), Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin (Oğuzeli), Şanlıurfa (Ceylanpınar) ve Tunceli (23, 90, 93, 103). Ayrıca, daha önce Fethiye (18), İzmir (Ödemiş-Kızılcaavlu)'den ve Kervansaray (22) ise A. cuprifera adı verilen İzmir'den bildirilmişlerdir (90).

İncelenen Materyal: ERTİNCAN: (Merkez-Ençel Kültürleri Araş. Enst. 7.7.1.1., 1, 1250 m, 14.6.1996, 1, 1250 m) (Topla [redacted] sayısı: 2). Örnekler Achillea biebersteinii üzerinden vakalanmıştır.

Acmaeoderella (Euacmaeoderella) villosula (Steven, 1830)

Sinonim: *-boryi* Brulle, 1832; *-steveni* Faldermann, 1838; -ssp. *hispana* Abeille de Perrin, 1900; *-cyanipennis* Abeille de Perrin, 1912 (78, 101, 103).

Dünyadaki yayılışı: Afganistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, İspanya, İsrail, Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Portekiz, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ürdün ve Yunanistan (78, 102, 103, 104, 108, 109).

2- Pronotum'un posterior kenarı zayıf şekilde zızkaklı; elytral epipleura elytra'nın ucuna ulaşır; pronotum nokta şeklinde çukurculu veya kırışık yapida (Anthaxiini) *Anthaxia*

- Pronotum'un posterior kenarı belirgin bir şekilde zızkaklı; elytral epipleura elytra'nın sadece humeral kısmında gelişmiş; pronotum'un yüzeyi nokta şeklinde ve az çok birleşen basit çukurculardan oluşur (Melanophiliini) 3

3- Clypeus'un ön kenarı kavisli, yanlarda keskin çıkışlılar oluşturur (Şekil 5.5); anten segmentleri 4. segmentten itibaren testere dışı şeklinde; arka tarsus'un basal segmenti 2. ve 3. segmentlerin toplam uzunluğu kadar; elytra'nın apikal sivri veya yuvarlağımsı *Melanophila*

- Clypeus'un ön kenarı çok yüzeysel kavisli, yanlarda yuvarlağımsı çıkışlı (Şekil 5.6); anten segmentleri 3. segmentten itibaren testere dışı şeklinde; arka tarsus'un basal segmenti 2. ve 3. segmentlerin toplamından daha kısa; elytra'nın apikal yuvarlağımsı *Phaenops*

4- Mesepimera'nın anteriorünün dış köşesi küt; mesepimera'nın iç ve dış kenarları posterierde birleşir (Şekil 5.3); elytra sıralı nokta şeklinde çukurculu, üzerinde düz kabartılı alanlar var (Dicercini) 5

- Mesepimera'nın anteriorünün dış köşesi sivri; mesepimera'nın iç ve dış kenarı hemen hemen paralel (Şekil 5.4); elytra belirgin çizgili, üzerinde düz kabartılı alan yok (Buprestini) 7

5- Elytra'nın apesi daralarak uzanır ve sivrice; scutellum çok küçük, yuvarlağımsı veya dört köşeli; arka tarsus'un 1. ve 2. segmentleri eşit uzunlukta; 8. abdominal sternit görülebilir *Dicerca*

- Elytra'nın apesi uzun ve sivri değil; scutellum büyük ve genellikle enine genişler; arka tarsus'un basal segmenti 2. segmentten daha uzun; 8. abdominal sternit görülmez 6

6- Metasternum ve 1. abdomen segmenti ortada çok belirgin olarak çöküntülü; prosternal yapı konveks; elytra'nın posterior kenarları dişli değil, her bir elytron 2 küçük apikal çıkıştı taşı; vücut koyu ve bronz parlaklıktır *Poecilonota*

- Metasternum ve 1. abdomen segmenti ortada çok yüzeysel çöküntülü; prosternal yapı düz; elytra'nın posterior kenarları dişli; metalik yeşil renkte *Scintillatrix*

7- Scutellum küçük, yuvarlak veya nadiren enine genişler; erkeklerin ön tibia'sının apikalının iç kısmında çengel şeklinde çıkıştı var veya yok (Şekil 5.7); arka

tarsus'un 1. segmenti 2. segmentten daha uzun *Buprestis*

- Scutellum çok büyük, enine elips şeklinde; erkeklerin ön tibia'sının apikalının iç kısmında çengel şeklinde çıkıştı yok (Şekil 5.8); arka tarsus'un 1. segmentinin uzunluğu 2. segmentin uzunluğunun 1,5 katı veya biraz daha kısa *Eurythyrea*

Dicercini

Dicerca Eschscholtz, 1829

Tip tür: *Buprestis acuminata* Pallas, 1782

Sinonim: *Stenurus* Kirby, 1837 (4, 100).

Dicerca (s.str.) *chlorostigma* Mannerheim, 1837

Dünyadaki Yayılışı: Azerbaycan, Dağıstan, Ermenistan (Erivan), Gürcistan, Kırım, Romanya ve Rusya (80, 96).

Türkiye'deki Yayılışı: Türkiye faunası için yeni kayıttır.

İncelenen Materyal: ARTVIN: (Hopa 19.7.1991, 1 , 100 m). İncelenen tek erkek birey yabancı otlar üzerinden alınmıştır.

Poecilonota Eschscholtz, 1829

Tip tür: *Buprestis variolosa* Paykull, 1799

Sinonim: *Castalia* Gory & Laporte, 1837 (100).


Poecilonota variolosa (Paykull, 1799)

Sinonim: *-tenebrionis* Schaeffer, 1766; *-rustica* Herbst, 1787; *-plebeia* Olivier, 1790; *-variolosa* Paykull, 1799; *-conspersa* Gyllenhal, 1808; *-plebeja* Gory & Laporte, 1837; *-aspersa* Rose, 1866; *-diceroides* Reitter, 1888; *-tremula* Richard, 1889; *-tremula* Rey, 1890; *-tulosa* Reisch, 1891; *-tremula* Reitter, 1896 (4, 60, 94, 96, 97, 105).

Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Avusturya, Çekoslovakya, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere, İsviçre, İtalyan (Basilicat, Kuzey Kısımları), Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan (4, 6, 8, 9, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105).

Türkiye'deki Yayılışı: Edremit (6), Kırklareli (1), Zederbauer (114), Denizli (Orta Menderes), Kırşehir (dogu kesiminde, Charas 25) ve Rize (96). Bu türde kalite belirtmeksızın Türkiye'de bulunmuştur bu belirtiler hedefdirler.

İncelenen Materyal: ARTVIN: (Hizan 18.8.1995, 1 , 1900 m); (Hizan 18.8.1995, 1 , 1900 m); (Hizan 27.8.1996, 1 , 2100 m, 10.7.1997, 1 , 2200 m); KARS: (Sarıkamış 10.7.1996, 1 , 2200 m) (Toplam örnek sayısı: 9). Örnekler *Populus nigra* ve *P. tremula* sürgünleri üzerinden alınmıştır.



Şekil 5. 1-8. Buprestinae altfamilyasına bağlı tribüs ve cinslerin teşhis karakterleri, 1-2. Metepimera yapıları, *Anthonax hungar* Scop., 2. *Buprestis rustic* ... 3-4. Mesepimera yapıları, 3. *Dicerca berolinensis* Herbst, 4. *Eurythyrea austriaca* Sc. 5-6. Clypeus yapıları, 5. *Melonophila cuspida* (Klug), 6. *Phaenops cyanea* (Fabricius) 7-8. Ön tibia, 7. *Buprestis rustic* L., 8. *Eurythyrea quer* (Herbst) () (1, 2, 3, 4 (4)'den).

Scintillatrix Obenberger, 1955

Tip tür: *Buprestis rutilans* Fabricius, 1777

Sinonim: *Lampra* Lacordaire, 1835; *Castalia* Castelnau & Gory, 1837; [] tremans 1900 (80, 94, 96, 105).

Scintillatrix gloriosa (Marseul, 1865)

Sinonim: -*cupraria* Obenberger, 1921; -*chariessa* Obenberger, 1924; -*chalcae* Obenberger, 1930 (80, 96, 105).

Dünyadaki Yayılışı: Bosna-Hersek, Bulgaristan, Ermenistan (Ervan), Irak, İran, Israel, İtalya, Makedonya, Mezopotamya, Suriye, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan (23, 80, 102, 103, 117).

Türkiye'deki Yayılışı: Muğla (Milas (104)). Ayrıca, Obenberger (23), lokalite belirtmeksizin Türkiye'de bulunduğuunu belirtmemiştir.

İncelenen Materyal: ERZURUM: (Pasinler 13.7.1996, 1, 1600 m). İncelenen tek dişi birey *Salix nigra* yaprakları üzerinden toplu olmuştur.

Buprestini

Eurythyrea Lacordaire, 1835

Tip tür: *Buprestis quercus* Herbst, 1780

Sinonim: *Buprestis* Castelnau et Gory, 1837; *Eurythrea* Oliveira, 1884 (80, 116).

Eurythyrea quercus (Herbst, 1780)

Sinonim: -*rusticus* Fourcroy, 1785; -*scutellaris* Olivier, 1790; -*carniolica* Herbst, 1801; -*similis* Schönherr, 1817; -*oblita* Faldermann, 1835; -*austriaca* Lacordaire, 1835; -*luigionii* Leoni, 1911; -*jugoslavica* Obenberger, 1934; -*ignita* Balthasar, 1935 (80, 94, 96, 105).

Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çekoslovakya, Dağıstan, Fransa, Gürcistan, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya (Güney ve Kuzey Kısmı), Yugoslavya ve Yunanistan (80, 96, 97, 105, 117).

Türkiye'deki Yayılışı: Fairmaire (19) tarafından *E. carniolica* adı altında lokalite belirtmeksizin bildirilmiştir.

İncelenen Materyal: ARTVİN: (Atılı 15.7.1993, 1, 1000 m). İncelenen tek erkek birey *Picea orientalis* kütükleri üzerinde yakalanmıştır.

Buprestis Linnaeus, 1758

Tip tür: *Buprestis octoguttata* Linnaeus, 1758

Sinonim: *Ancylotricha* Eschscholtz, 1829; *Gymnota* Gistl, 1834; *Anoplis* Kirby, 1837 (4).

Buprestis Cinsinin Altçins ve Türlerinin Tanı Anahtarı

1- Pronotum'un ortasında önden arkaya doğru boydan boyra uzanan sarı bant bulunur (Şekil 6.1); erkek ve dişinin ön tibia'sının uç kısmı iç kenarda çengel şeklinde çıkıştı taşımaz (Şekil 6.13, 18); arka tarsus'un 1.

segmentinin boyu sonraki 3 segmentin toplamının yaklaşık yarısı kadar (Şekil 6.30) (Altcins: *Orthoheria*) *B. salomonii*


- Pronotum'un ortasında bant bulunmaz (Şekil 6.2, 3, 4, 5, 6); erkekte ön tibia üç kısmının iç kenarında çengel şeklinde çıkıntı taşır (Şekil 6.19, 20, 21, 22, 23), dişide bu çıkıntı bulunmaz (Şekil 6.14, 15, 16, 17); arka tarsus'un 1. segmentinin boyu takip eden 3 segmentin toplamından biraz kısa veya eşit uzunlukta (Şekil 6.29, 31, 32, 33, 34) (Altcins: *Buprestis*) 2

2- Elytra üzerinden sarı renkli benekler bulunmaz (Şekil 6.2, 5) 5

- Elytra üzerinde sarı renkli ve düzensiz şekilli benekler bulunur (Şekil 6.3, 4, 6) 3

3- Anten'in 1. segmentinin uzunluğu takip eden 2 segmentin toplamından daha uzun (Şekil 6.7); scutellum üçgenimsi (Şekil 6.10); arka tarsus'un 1. segmentinin boyu sonraki 3 segmentin toplamı kadar (Şekil 6.34); dişide anal sternit'in üç kısmı ortada oldukça girintili çıkıntıları (Şekil 6.24) *B. octoguttata*

- Anten'in 1. segmentinin uzunluğu takip eden 2 segmentin toplamı kadar veya daha kısa; scutellum hemen hemen kare veya dikdörtgenimsi; arka tarsus'un 1. segmentinin boyu sonraki 3 segmentin toplamından biraz kısa; dişide anal sternit'in üç kısmı ortada az girintili çıkıntıları (Şekil 6.27, 28) 4



Şekil 6. 1-6. Vücutun genel görünümü. 1. *Buprestis (Orthoheria) salomonii* Thomson, 2. *B. (s.str.) haemorrhoidalis araratica* De Marseul, 3. *B. (s.str.) tarsensis* De Marseul, 4. *B. (s.str.) octoguttata* L., 5. *B. (s.str.) rustica* L., 6. *B. (s.str.) dalmatina* Marseul; 7. Anten, 8. *B. (s.str.) octoguttata*, 9. *B. (s.str.) tarsensis*, 10. *B. (s.str.) dalmatina*; 10. Scutellum, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Arka tarsus, 29. *B. (s.str.) haemorrhoidalis araratica*, 30. *B. (O.) salomonii*, 31. *B. (s.str.) rustica*, 32. *B. (s.str.) tarsensis*, 33. *B. (s.str.) dalmatina*, 34. *B. (s.str.) octoguttata* (Ölçek 1 mm).

4- Anten'in 1. segmenti takip eden 2 segmentin
toplami kadar uzunlukta (Şekil 6.8); scutellum hemen
hemen kare şeklinde (Şekil 6.11); erkekte ön tibia'nın üç
kısının iç kenarında bulunan çengel şeklindeki çıkıştı
uzun ve sıvri (Şekil 6.20) *B. tarsensis*

- Anten'in 1. segmenti takip eden 2 segmentin toplamindan daha kisa (Şekil 6.9); scutellum hemen hemen dikdörtgenimsi (Şekil 6.12); erkekte ön tibia'nın üç kısmının iç kenarında bulunan çengel şeklindeki çıkıştı kisa ve geniş (Şekil 6.21) *B. dalmatina*

5- Pronotum'un en geniş yeri ortada (Şekil 6.5); abdomen'in 1. segmentinin alt yüzünde arka coxa'nın hizasından başlayıp arkaya doğru giden uzunlamasına oyuk çok yüzeysel; erkekte ön tibia'nın uç kısmının iç kenarında bulunan çengel şeklindeki çıkıştı küçük (Şekil 6.22); erkekte anal sternit üç kısmında sık girintili çıkıştı (Şekil 6.25) *B. rustica*

- Pronotum'un en geniş yeri posteriorde (Şekil 6.2); abdomen'in 1. segmentinin alt yüzünde arka coxa'nın hizasından başlayıp arkaya doğru giden uzunlamasına oyuk derin; erkekte ön tibia'nın üç kısmının iç kenarında bulunan çengel şeklindeki çıktıtı büyük (Şekil 6.23); erkekte anal sternit üç kısımda daha az girintili çıktıtı (Şekil 6.26) *B. haemorrhoidalis araratica*

Buprestis (s.str.) *dalmatina* Mannerheim, 1837

Sinonim: *-flavostrigata* Frivalszky, 1845; *-ledererii* Marseul, 1865; *-semirviridescens* Pic, 1918; *-adanensis* Obenberger, 1941; *-alauita* Obenberger, 1941; *-aleppensis* Obenberger, 1941; *-ciliicia* Obenberger, 1941; *-euboeica* Obenberger, 1941; *-fleischnerella* Obenberger, 1941; *-olympica* Obenberger, 1941; *-pauperula* Obenberger, 1941; *-pisidica* Obenberger, 1941; *-taygetica* Oben[REDACTED] 941; *-turcica* Obenberger, 1941; (80[REDACTED]).

Dünyadaki yayılış Arnavutluk, Dalmacya, Kibrıs, Mısır, Suriye, Türkistan, Yunanistan ve Yugoslavya (10, 96, 102, 109, 118).

Türkiye'deki Yarım Adası: Adana (Kozlu), Çanakkale (Çanakkale Boğazı), Çanakkale (Akseki, Alanya (Merkez, Kemer, Sarıyer, İbradı, İnceburun, İnceburun Boğazı), Çanakkale (Çanakkale Boğazı), Çanakkale (Gündoğmuş, Manavgat, Sağız, Termessos, Yarpuz, Çanakkale (Yukarı Karaman), Bursa (Osmancık, İllüdağ Massiv), Balıkesir (Edremit), Hatay (Antakya, İskenderun, İskenderun Boğazı), İskenderun (Çamlıyayla, Erdemli, Gülek, Silifke, Muğla), İstanbul (Adalar), İzmir (Bornova, Karaburun (Marmaris), Konak (Gaziemir), Torbalı), Kahramanmaraş (Ceyhan), Konya, Muğla (Marmaris) ve Toros Dağları (103, 104, 105, 106, 107, 108, 109).

İncelenen Materyal: ARTVİN uc-Tep
29.6.1996. 1 . 2 . 1200 m Topl. Visi:

3). İncelenen örnekler *Abies* sp. ve
üzerinden toplanmıştır.

Buprestis (s.str) *haemorrhoidalis* De Marseul, 1865

Sinonim: *-pannonica* Obenberger, 1941; *-lucniki* Obenberger, 1941; *-zacharovi* Obenberger, 1941; *-pontica* Obenberger, 1941 (96).

Dünyadaki yayılışı: Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Rusya (Güney Bölgesi), Suriye, Türkiye, Yunanistan ve Yunanistan (7, 96, 105, 119).

Türkiye'deki Yayılışı: Artvin (Ardahan, Şavşat, Yusufeli-Altipazarlık), Bolu (Abant), Giresun, Rize, Sinop (Ayancık) (13, 33, 85, 104, 120).

İncelenen Mate [REDACTED] ARTVİN: [REDACTED] danuç 24.6.199[REDACTED]
1 , 600 m; Şavşat 17 [REDACTED] 1 , 1000 m) (Topla
örnek sayısı: 2). Örnekler *Picea orientalis* üzerinde
almıştır.

Buprestis (s.str.) *octoguttata* Linnaeus, 1758

Sinonim: *-albopunctata* De Geer, 1774; *-magica* Castelnau et Gory, 1837; -ssp. *mauritanica* Lucas, 1844; - ssp. *corpulenta* Fai [REDACTED] 184; -*bohemica* Obenberger, 1921; -*maculata* H. [REDACTED] 1921; - *luteoangulata* Obenberger, 1938; -*terybalis* Obenberger, 1938; -*akbesiana* Obenberger, 1941 (4, 80, 94).

Dünyadaki Yarışması: Almanya, Avusturya, B
Cezayir, Çekoslovakya, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Galler, Gürcistan (Tiflis), İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya,
Kazakistan (Batı Kuzeyi), Korsika, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya,
Türkiye, Yugoslavya ve Afganistan (4, 5, 15, 35, 96, 102,
105, 118).

Turkiye Yayılışı: Bolu (Tosya-Dipsiz gölü), Kastamonu (Kız Dağları), Bartın (Akbez-Amanos Dağları), [redacted]

Material: ARTVİN: Merkez-Seka Fabrikası
2.1993, 120 m). İncelenen tek dişli birey *Abies* sp.

erinden alınır.

Buprestis (s.str.) *rustica* Linnaeus, 1758
Sinonim: -*violacea* De Geer, 1774; -*lata* Sulzer, 1776;
-*maculata* Kraatz, 1880; -*signaticeps* Fleischer, 1887; -*ternata* Fleischer, 1887; -*obscura* Schilsky, 1888; -ssp.
erli Obenberger, 1925; -*combinata* Obenberger, 1941; -*multipla* Obenberger, 1941; -*prosternalis* Obenberger, 1941; -*pseudohaemorrhoidalis* Obenberger, 1941; -*tetrastictula* Obenberger, 1941 (4, 80, 94, 96).

Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Çekoslovakya, Danimarka, Estonia, Fas, Finlandiya, Fransa, [redacted] Hollanda, İngiltere, İspanya (Pirene Dağları), İsveç, İsviçre, İtalya, Korsika, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Tunus, Türkiye (Kuzeyi), Yugoslavya ve Yunanistan (Kuzeyi) (4, 80, 81, 96, 97, 102, 104, 105).

Türkiye'deki Yayılışı: Artvin (Şavşat), Giresun (Gümüşhane (Torul), Kastamonu (Sarıkamış), Rize ve Sinop (Ayancık) (13, 63, 85, 120, 121).

İncelenen Materyal: [redacted] İN: (Şanlıurfa) Yanıklı 5.9.1992, 1 , 1800 m). İncelenen tek birey *Picea orientalis* üzerinden alınmıştır.

Buprestis (s.str.) *tarsensis* Marseul, 1865

Sinonim: -*exclamationis* Pic, 1918; -*mimica* Pic, 1918; -*immaculata* Pic, 1918; -*krüperi* Obenberger, 1941; -*revocans* Obenberger, 1941; -*achaia* Obenberger, 1941; -*palladis* Obenberger, 1941 (80, 96).

Dünyadaki Yayılışı: İran, Kıbrıs, Libya, Mısır, Suriye, Yunanistan ve Türkiye (80, 96, 102).

Türkiye'deki Yayılışı: Adana (Kozan), Antalya, Denizli, İzmir (Bornova, Buca, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak) ve Toros Dağları (16, 66, 80, 104, 122).

İncelenen Materyal: [redacted] İURUM: (Düzce 9.9.1996, 1 , 1850 m) (Toplanma sayısı: 2). Örnekler *Abies sp.* üzerinden toplanmıştır.

Buprestis (Orthocheria) salomonii Thomson, 1878

Sinonim: -*davidi* Fairmaire, 1882; -*metallescens* Abeille, 1891; -ssp. *vavra* Nonfriend, 1894; -*caucasica* Obenberger, 1938; -*decemguttulata* Obenberger, 1938; -*jacopsoni* Obenberger, 1938; -*nikolskyi* Obenberger, 1938; -*nonfriedi* Obenberger, 1941; -*thomsoni* Obenberger, 1938; -*thosroveni* Obenberger, 1941; -*samarinda* Obenberger, 1941; -*teheranensis* Obenberger, 1941 (80, 96).

Dünyadaki Yayılışı: Azerbaycan, Çeçenya (Kuzeyi), Ermenistan, Gürcistan, İran (Bati ve Kuzey Kısımları), Özbekistan, Suriye, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan (80, 96, 108, 109, 118).

Türkiye'deki Yayılışı: Iğdır (104).

İncelenen Materyal: [redacted] ERZURUM: (Artvin 4.7.1993, 1 , 1350 m) (Toplanma sayısı: 2). İncelenen örnekler *Populus nigra* üzerinden toplanmıştır.


Melanophilini

Melanophila Eschscholtz, 1829

Tip tür: *Buprestis acuminata* De Geer, 1774

Şekil 7.

1-2. Vücutun genel görünümü. 1. *Melanophila (Trachypterus) picta decastigma* (Fabricius). 2. *Melanophila* (s.str.) *cuspidata* (Klug); 3-4. Elytra'nın ucu. 3. *M. (T.) picta decastigma*. 4. *M. (s.str.) cuspidata*, 5-6. Anal sternit. 5. *M. (T.) picta decastigma* (). 6. *M. (s.str.) cuspidata* () (Ölçek 1 mm).



Sinonim: *Buprestis* Latreille, 1810; *Trachypterus* Kirby, 1837; *Oxypterus* Kirby, 1837; *Phaenops* Dejean, 1837; *Analampis* Dejean, 1837; *Apatura* Gory & Laporte de Castelnau, 1841; *Diana* Gory & Laporte de Castelnau, 1841 (4, 95, 100).

Melanophila Cinsi Türlerinin Tanı Anahtarı

- Elytra üzerinde açık sarı, düzensiz şekilli benekler var (Şekil 7.1), elytra'nın uç kısımları yuvarlağımsı şekilde son bulur (Şekil 7.3); dişide anal sternit'in uç kısmı ortada çok belirgin olarak girintili çıkışlı (Şekil 7.5); parlak bakırımsı renkte *M. picta decastigma*

- Elytra üzerinde benek bulunmaz (Şekil 7.2), elytra'nın uç kısımları sıvri şekilde son bulur (Şekil 7.4); dişide anal sternit'in uç kısmı ortada çok hafif girintili çıkışlı (Şekil 7.6); parlak siyah renkte *M. cuspidata*

Melanophila (s.str.) *cuspidata* (Klug, 1829)

Sinonim: *-nigrata* Fabricius, 1798; *-regalis* Fabricius, 1801; *-aequalis* Mannerheim, 1837; *-oxyura* Marquet, 1874; *-aerata* Costa, 1882; *-acutespina* Reitter, 1893; *-jakovlevi* Semenov, 1900; *-hungarica* Csiki, 1905 (80, 94, 95, 97, 105).

Dünyadaki Yayılışı: Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Fas, Fransa, Gürcistan, İran, İspanya, İtalya, Kazakistan, Mısır, Özbekistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan (80, 94, 97, 102, 105, 108).

Türkiye'deki Yayılışı: İçel (Anamur, Erdemli) ve İzmir (Selçuk) (104).

İncelenen Materyal: ARTVİN: (Yusufeli 5.8.1991, 1 , 500 m). İncelenen tek dişi birey kesilmiş *Salix alba* üzerinden yakalanmıştır.

Melanophila (*Trachypterus*) *picta decastigma* (Fabricius, 1787)

Sinonim: *-silphoides* Schrank, 1788; *-quattuordecimpunctata* Olivier, 1790; *-chrysostigma* Fabricius, 1793; *-consobrina* Chevrolat, 1854; *-anatolica* Pic, 1898; *-atomosparsa* Obenberger, 1917; *-quadrinotata* Pic, 1918; *-meridionalis* Pic, 1918; *-multinotata* Pic, 1918; *-subjuncta* Pic, 1918; *-henoni* Bedel, 1921; *-parvipunctata* Obenberger, 1924; *-difficilis* Vitale, 1930; *-pici* Vitale, 1930; *-reitteri* Vitale, 1930; *-completa* Obenberger, 1931; *-erivana* Obenberger, 1931; *-fascigera* Obenberger, 1931; *-gaudens* Obenberger, 1931; *-octogonifera* Obenberger, 1931; *-rolandi* Obenberger, 1931; *-bisquinquenotata* Obenberger, 1944; *-caucasica* Obenberger, 1944; *-chtaurae* Obenberger, 1944; *-combinans* Obenberger, 1944; *-eminens* Obenberger, 1944; *-eutenis* Obenberger,

1944; *-fleischerella* Obenberger, 1944; *-formosula* Obenberger, 1944; *-gratiosula* Obenberger, 1944; *-hofferi* Obenberger, 1944; *-insignis* Obenberger, 1944; *-karavajevi* Obenberger, 1944; *-kavani* Obenberger, 1944; *-lateralis* Obenberger, 1944; *-lebedevi* Obenberger, 1944; *-libanonica* Obenberger, 1944; *-lucniki* Obenberger, 1944; *-mequignoni* Obenberger, 1944; *-octodecimguttata* Obenberger, 1944; *-skrlandti* Obenberger, 1944; *-staneki* Obenberger, 1944; *-stolickai* Obenberger, 1944; *-zcharevi* Obenberger, 05).

Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin (Kuzeyi), Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Galler, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Romanya, Sırbistan, Sıfyoniya, Suriye, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan (80, 94, 97, 102, 105).

Türkiye'deki Yayılışı: Balıkeder (Marmara Denizi), Erzurum ve Malatya (Dicle, Göksu, Kızılırmak) (Dicle, Göksu, Kızılırmak). Bunun yanında, Sekerdere (Bozcaada) (Bozcaada Adası) tarafında da benzer geliş göstermektedir.

İncelenen Materyal: ARTVİN: (Bozcaada Adası) 7.1994 1 , 1600 m; ERZİNCAN: (Bozcaada Adası) 16.10.1994 1 , 1600 m; ERZURUM: (Bozcaada Adası) 16.10.1994 1 , 1600 m; (Toplam 38). Erginler kesilerek yiğilmiştir. *Populus alba*, *P. nigra*, *P. tremula*, *Salix alba* ve *S. nigra* üzerinden toplanmıştır. Ayrıca, larvaları da kabuk altlarından alınmıştır.

Phaenops Dejean, 1833 (123, 124).

Tip tür: *Buprestis cyanea* Fabricius, 1775

Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)

Sinonim: *-chalybaea* Villers, 1789; *-azurea* Olivier, 1790; *-tarda* Fabricius, 1794; *-clypeata* Paykull, 1799; *-aerea* Ganglbauer, 1886; *-ssp. knoteki* Reitter, 1898; *-viridisces* Pic, 1909; *-formaneki* Jacops., 1913; *-coeruleolimbata* Pic, 1918; *-sibirica* Pic, 1918; *-hellenica* Obenberger, 1924; *-ssp. thessala* Obenberger, 1924; *-transbaicalica* Obenberger, 1924; *-turbans* Obenberger, 1924 (4, 80, 94, 95, 97, 105, 125).

Dünyadaki Yayılışı: Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin (Kuzeyi), Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Galler, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya,

Kazakistan, Korsika, Litvanya, Macaristan, Moğolistan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Türkiye, Ukrayna, Yugoslavya ve Yunanistan (80, 84, 95, 97, 102, 105, 109, 116).

Türkiye'deki Yayılışı: Artvin (Savsat) ve Balıkesir (Dursunbey) (46, 51, 63, 120); Trabzon, Niğde (104), *Melanophila cyanea* adı ile Amasya (Beypazarı) ve Eskişehir (Çifteler)'de bulunduğu belirtmiştir.

İncelenen Materyal: A. (C.) ~~sponsa~~ 1995, 1 . 1000 m, Çarlıpnar 23.6.1993, 1 . , 1100 m, Çukur 23.6.1993, 1 . 1000 m) (Toplam örnek sayısı: 3). Örnekler kesilmiş *Picea orientalis* üzerinde alınmıştır.

Anthaxiini

Anthaxia Eschscholtz, 1829

Tip tür: *Buprestis fulgurans* Schrank, 1789

Sinonim: *Anthraxia* Stephens, 1839; *Paranthaxia* Gozis, 1886; *Anthaxicola* Rikhter, 1944; *Callanthaxia* Rikhter, 1944; *Chrysanthaxia* Rikhter, 1944; *Cryptanthaxia* Rikhter, 1944; *Cryptocratomerus* Rikhter, 1944; *Cyclanthaxia* Rikhter, 1944; *Euanthaxia* Rikhter, 1944; *Homanthaxia* Rikhter, 1944; *Mesanthaxia* Rikhter, 1944; *Trichocratomerus* Rikhter, 1944; *Cratomerella* Rikhter, 1949; *Eoanthaxites* Haupt., 1950 (126).

Anthaxia Cinsinin Altçins, Tür ve Alttürlerinin Tanı Anahtarı

- 1- Genel olarak vücut siyah ve koyu bronz renkte (Altçins: *Melanthaxia*) 17
 - Vücut siyah ve koyu bronz renkte değil 2
- 2- Vücut önden arkaya belirgin şekilde daralar boyları genel olarak 6-14 mm. kadar (Altçins: *Cratomerus*) .. 4
 - Vücut önden arkaya doğru belirgin şekilde daralmaz, boyları genel olarak 3-8 mm. kadar 3
- 3- Pronotum ve elytra'nın lateral kenarları orta kısımlarda geniş (Altçins: *Anthaxia*) 6
 - Pronotum ve elytra'nın lateral kenarları posteriore doğru paralel olarak uzanır (Altçins: *Haplanthaxia*) .. 12
- 4- Erkekte arka tibia dar, taban kısmının hemen yakınından uca doğru seyrek dişli (Şekil 8.1); aedeagus Şekil 9.1'deki gibi; boy 7,40-8,90 mm A. (C.) *sponsa*
 - Erkekte arka tibia oldukça geniş, yaklaşık ortadan uca doğru sık ve belirgin dişli (Şekil 8.2, 3); aedeagus Şekil 9.2 ve 9.3'deki gibi 5
- 5- Erkekte arka tibia Şekil 8.2'deki gibi; erkek ve dişide elytra'nın lateral kenarları ve üç kısım dişli yapıda (Şekil 8.19, 20); erkekte dorsal yüzey tamamen metalik

yeşil, dişli baş ve pronotum lateral kenarları yeşil-turuncu karışımı, pronotum'un üstü metalik yeşil, elytra koyu menekşe veya yeşilimsi menekşe renkli; aedeagus Şekil 9.2'deki gibi; boy 6,35-13,25 mm A. (C.) *hungarica*

- Erkekte arka tibia Şekil 8.3'deki gibi; erkek ve dişide elytra'nın lateral kenarları ile üçüncü kısmı daha kalın dişli (Şekil 8.21-22); erkekte dorsal yüzey tamamen metalik yeşil, dişli baş ve turuncu karışımı, pronotum'un üstü kenarları metalik turuncu, diğer kısımlar metalik yeşil; aedeagus Şekil 9.3'deki gibi; boy 5,90-7,70 mm A. (C.) *diadema*

6- Erkekte arka tibia'nın iç yüzeyi tabanın yaklaşık 1/3'lük kısmından uca doğru dişli yapıda (Şekil 8.4); aedeagus Şekil 9.4'deki gibi..... A. (s.str.) *turcomanica*

- Erkekte arka tibia'nın iç yüzeyi sadece üç kısımlarda dişli (Şekil 8.6, 7, 8, 9); aedeagus farklı şekillerde 7

7- Paramer'ler arasındaki açıklık kaide kısmına yakın yerden başlar (Şekil 9.8) 10

- Paramer'ler arasındaki açıklık kaide kısmının en az ortaya yakın yerinden başlar (Şekil 9.5, 6, 7) 8

8- Paramer'ler arası açıklık üç kısma yakın yerden başlar (Şekil 9.5) A. (s.str.) *nigricollis*

- Paramer'ler arasındaki açıklık ortaya yakın veya orta kısımdan başlar (Şekil 9.6, 7) 9


9- Vertex'in genişliği bileşik gözün genişliğinin erkekte 1,77, dişide ise 1,73 katı; her iki eşyede de elytra'nın uzunluğu genişliğinin 1,6-1,7 katı; erkekte arka tibia Şekil 8.6'daki gibi; aedeagus Şekil 9.6'daki gibi, paramer'ler arasındaki açıklık ortaya yakın kısımdan başlar (Şekil 9.6); boy 5,90-7,40 mm. .. A. (s.str.) *bicolor*

- Vertex'in genişliği bileşik gözün genişliğinin erkekte 1,81, dişide 2,15 katı; elytra'nın uzunluğu genişliğinin erkekte 1,7-1,8, dişide ise 1,4-1,5 katı; erkekte arka tibia Şekil 8.7'deki gibi; aedeagus Şekil 9.7'deki gibi, paramer'ler arası açıklık ortadan başlar (Şekil 9.7); boy 4,50-6,05 mm..... A. (s.str.) *muliebris*

10- Elytra'nın üç kısmı ile lateral kenarları her iki cinsiyette de seyrek dişli (Şekil 8.23, 24); aedeagus'un üç kısmı sıvı (Şekil 9.8) A. (s.str.) *hypomelaena*

- Elytra'nın üç kısmı ile lateral kenarları her iki cinsiyette de sık dişli (Şekil 8.26, 27, 29, 30); aedeagus'un üç kısmı yuvarlağımsı (Şekil 9.9, 10) 11

11- Erkek ve dişide vertex'in genişliği bileşik gözün 1,85 katı; erkekte arka tibia Şekil 8.9'daki gibi; erkek ve



Şekil 8. 1-18. Arka tibia (). 1. *Anthaxia (Cratomerus) sponsa* Kiesenwetter, 2. A. (C.) *hungarica* (Scopoli), 3. A. (C.) *diadema* (Fischer), 4. A. (s.str.) *turcomanica* Obenberger, 5. A. (s.str.) *nigricollis* Abeille de Perrin, 6. A. (s.str.) *bicolor* Faldermann, 7. A. (s.str.) *muliebris* Obenberger, 8. A. (s.str.) *hypomelaena* (Illiger), 9. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* Krynicki, 10. A. (s.str.) *discicollis* Gory & Laporte, 11. A. (H.) *clavigera* (Olivier), 12. A. (H.) *lefeuvrei* (Fabricius), 13. A. (H.) *essica* (Daniech), 14. A. (H.) *lebasi* Brandt, 15. A. (H.) *gymnica* (Kiesewetter), 16. A. (H.) *luteola* (Melanthus), 17. A. (H.) *luteola* de Perrin, 18. A. (H.) *luteola* Gory & Laporte, 19-21. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* (). 22. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* (). 23. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* (). 24. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* (). 25. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* (). 26. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* (). 27. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* (). 28. A. (H.) *nitidula signaticollis* (). 29, 30. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* (). 31. A. (H.) *nitidula signaticollis* (). 32-35. Anal sterna (). 33. A. (s.str.) *nitidula signaticollis* (), 34, 35. A. (s.str.) *discicollis* (). (Ölçek 1mm).

dişide anal sternit'in uç kısmı ile lateral kenarları kalın dişli (Şekil 8.32, 33); pronotum'un genişliği uzunluğunun erkek ve dişide 1,8-1,9 katı; aedeagus'un uç kısmı oldukça genişlemiş (Şekil 9.9); boy 5,0-6,10 mm A. (s.str.) *nitidula signaticollis*

- Vertex'in genişliği bileşik gözün erkekte 1,40, dişide 1,37 katı; erkekte arka tibia Şekil 8.10'daki gibi; erkek ve dişide anal sternit'in uç kısmı ile lateral kenarları ince dişli (Şekil 8.34,35); pronotum'un genişliği uzunluğunun erkek ve dişide 1,5-1,6 katı; aedeagus'un uç kısmı dar (Şekil 9.10) p boy 4,05-5,60 mm A. (s.str.) *discicollis*

12- Vertex'in genişliği bileşik gözün genişliğinin 2,36 katı; dişide elytra'nın uç kısmı ve lateral kenarı çok seyrek ve ince dişli (Şekil 8.31) A. (H.) *truncata*

- Vertex'in genişliği bileşik gözün genişliğinin en fazla 2,10 katı; dişide elytra'nın uç kısmı ve lateral kenarı oldukça sık ve kalın dişli (Şekil 8.25, 28) 13

13- Aedeagus'un lateral kenarları uç kısmın hemen üstünde testere dişi şeklinde (Şekil 9.11, 12) 14

- Aedeagus'un lateral kenarları testere dişi şeklinde değil (Şekil 9.13) 15

14- Vertex'in genişliği bileşik gözün erkekte 2,10, dişide 1,67 katı; erkekte arka tibia Şekil 8.11'deki gibi; aedeagus Şekil 9.11'deki gibi, paramer'ler uç kısımda genişler (Şekil 9.11); eşyel dimorfizm belirgin (erkekte dorsal yüzey tamamen metalik yeşil, dişide baş ve pronotum metalik yeşil, elytra genel olarak bakır

kırmızısı, taban kısmında ise metalik yeşil); boy 4,10-6, 55 mm A. (H.) *cichorii*

- Vertex'in genişliği bileşik gözün genişliğinin erkekte 1,71, dişide 1,91 katı; erkekte arka tibia Şekil 8.12'deki gibi; aedeagus Şekil 9.12'deki gibi, paramerler üç kısımda dar (Şekil 9.12); eşeysel dimorfizm yok (erkek ve dişide dorsal yüzey genel olarak metalik yeşil, elytra'nın üzeri fazla belirgin olmayan turuncu parıltılı); boy 3,75-5,35 mm. A. (H.) *millefolii*

15- Erkekte arka tibia'nın iç kısmı ortadan uca doğru oldukça belirgin ve sık dişli (Şekil 8.13); aedeagus tabandan uca doğru belirgin şekilde daralır (Şekil 9.13) A. (H.) *rossica*

- Erkekte arka tibia'nın iç kısmı üç kısımda daha az belirgin dişli (Şekil 8.14, 15); aedeagus tabandan uca doğru hemen hemen paralel olarak uzanır (Şekil 9.14, 15) 16

16- Erkekte vertex'in genişliği bileşik gözün genişliğinin 1,80 katı; erkekte arka tibia Şekil 8.14'deki gibi; pronotum'un genişliği uzunluğunun 1,5-1,6 katı; aedeagus Şekil 9.14'deki gibi A. (H.) *niehuisi*

- Erkekte vertex'in genişliği bileşik gözün genişliğinin 2,0 katı; erkekte arta tibia Şekil 8.15'deki gibi; pronotum'un genişliği uzunluğunun 1,6-1,8 katı; aedeagus Şekil 9.15'deki gibi A. (H.) *olympica*

17- Erkekte arka tibia'nın iç yüzeyi bazal kısmının biraz ilerisinden itibaren uca doğru seyrek veya sık dişli (Şekil 8.17, 18) 18

- Erkekte arta tibia'nın iç yüzeyi sadece üç kısımlarda dişli (Şekil 8.16); aedeagus Şekil 9.16'daki gibi; boy 6,05-6,25 mm A. (M.) *caucasica*

18- Vertex'in genişliği bileşik gözün erkekte 2,71, dişide ise 2,13 katı; erkekte arka tibia iç yüzeyde seyrek dişli (Şekil 8.17); clypeus'un anterior kısmı düz; aedeagus Şekil 9.17'deki gibi; boy 4,25-6,75 mm. ... A. (M.) *godeti*

- Vertex'in genişliği bileşik gözün erkekte, 1,81, dişide ise 2,0 katı; erkekte arka tibia iç yüzeyde sık dişli (Şekil 8.18); clypeus'un anterior kısmı ortada içe doğru yüzeysel çökük; aedeagus Şekil 9.18'deki gibi; boy 4,80-7,55 mm. A. (M.) *nigrojubata nigrojubata*

Anthaxia (s.str.) *bicolor* Faldermann, 1835

Sinonim: -*nitidula* Schoenherr, 1817; -*taurica* Mannerheim, 1837 (126).

Dünyadaki Yayılışı: Azerbaycan, Bulgaristan, Doğu Akdeniz, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, İsrail, Kafkasya, Özbekistan, Romanya, Rusya (Güney Avrupa Bölgesi), Suriye, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna (Güneyi), Sırbistan, Montenegro ve Yunanistan (126, 127, 128).

Yugoslavya ve Yunanistan (80, 95, 102, 108, 109, 121, 127, 128).

Türkiye'deki Yayılışı: -dana (Kadirli, Kozan, Kırşehir, Bafa Gölü), Hakkari (Beyda, İşkembe), İçel (Erdeğirmen), İzmir (Bornova) (122, 128).

İncelenen Materyal: ARTVIN: Yusufeli (12.5.1994, 1 , 1100 m); ERZURUM: Çavuşlu-Sütik (16.6.1996, 2 , 5 , 1550 m); ERZINCAN: Çavuşlu (16.6.1997, 1 , 1550 m) (Toplam örnek sayısı: 6). İncelenen örnekler *Achillea biebersteinii*, *A. millefolium* ve *Crepis foetida* bitkileri üzerinden toplanmıştır.

Anthaxia (s.str.) *discicollis* Gory & Laporte, 1835

Sinonim: -*corycea* Obenberger, 1934; -*blanchardi* Obenberger, 1938; -ssp. *kanaatina* Obenberger, 1912 (95).

Dünyadaki Yayılışı: Arnavutluk, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İsrail, Makedonya, Rusya (Güney Bölgesi), Suriye, Türkiye, Türkmenistan, Yugoslavya ve Yunanistan (80, 95, 102, 108, 126).

Türkiye'deki Yayılışı: Değişik araştırmacılar tarafından belirtmeksi gereken Türkiye'de bulunduğu bilinmemiştir (80, 95, 102, 108, 126).


İncelenen Materyal: ARTVIN: (Şavşat, 12.5.1997, 1200 m); ERZURUM: Çavuşlu-Sütik (16.6.1996, 2 , 5 , 1550 m); ERZINCAN: Çavuşlu (16.6.1997, 1 , 1550 m) (Toplam örnek sayısı: 15). İncelenen örneklerden Erzurum etiketli olanlar *Juniperus oxycedrus* ağaçlarının alt kısımlarında yer alan *Achillea coarctata*, *Crepis* sp. ve *Senecio vernalis* bitkileri üzerinden toplanmıştır.

Anthaxia (s.str.) *homoeaena* (Illiger, 1803)

Sinonim: -*nitidula* Gmelin, 1811; -*albostriata* Sturm, 1843 (126).

Dünyadaki Yayılışı: Arnavutluk, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, İspanya, İtalya (Sicilya), Galler, Grecia Adası, Kafkasya, Kıbrıs, Lübnan, Portekiz, Romanya, Rusya (Güneyi), Türkiye (Anadolu ve Batı Karadeniz, İç Anadolu, Ukrayna (Güneyi), Balkanlar, Makedonya ve Yunanistan) (94, 95, 102, 105, 106, 129).

Türkiye'deki Yayılışı: Anadolu (126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 58610, 58611, 58612, 58613, 58614, 58615, 58616, 58617, 58618, 58619, 58620, 58621, 58622, 58623, 58624, 58625, 58626, 58627, 58628, 58629, 58630, 58631, 58632, 58633, 58634, 58635, 58636, 58637, 58638, 58639, 58640, 58641, 58642, 58643, 58644, 58645, 58646, 58647, 58648, 58649, 58650, 58651, 58652, 58653, 58654, 58655, 58656, 58657, 58658, 58659, 58660, 58661, 58662, 58663, 58664, 58665, 58666, 58667, 58668, 58669, 58670, 58671, 58672, 58673, 58674, 58675, 58676, 58677, 58678, 58679, 58680, 58681, 58682, 58683, 58684, 58685, 58686, 58687, 58688, 58689, 58690, 58691, 58692, 58693, 58694, 58695, 58696, 58697, 58698, 58699, 586100, 586101, 586102, 586103, 586104, 586105, 586106, 586107, 586108, 586109, 586110, 586111, 586112, 586113, 586114, 586115, 586116, 586117, 586118, 586119, 586120, 586121, 586122, 586123, 586124, 586125, 586126, 586127, 586128, 586129, 586130, 586131, 586132, 586133, 586134, 586135, 586136, 586137, 586138, 586139, 586140, 586141, 586142, 586143, 586144, 586145, 586146, 586147, 586148, 586149, 586150, 586151, 586152, 586153, 586154, 586155, 586156, 586157, 586158, 586159, 586160, 586161, 586162, 586163, 586164, 586165, 586166, 586167, 586168, 586169, 586170, 586171, 586172, 586173, 586174, 586175, 586176, 586177, 586178, 586179, 586180, 586181, 586182, 586183, 586184, 586185, 586186, 586187, 586188, 586189, 586190, 586191, 586192, 586193, 586194, 586195, 586196, 586197, 586198, 586199, 586200, 586201, 586202, 586203, 586204, 586205, 586206, 586207, 586208, 586209, 586210, 586211, 586212, 586213, 586214, 586215, 586216, 586217, 586218, 586219, 586220, 586221, 586222, 586223, 586224, 586225, 586226, 586227, 586228, 586229, 586230, 586231, 586232, 586233, 586234, 586235, 586236, 586237, 586238, 586239, 586240, 586241, 586242, 586243, 586244, 586245, 586246, 586247, 586248, 586249, 586250, 586251, 586252, 586253, 586254, 586255, 586256, 586257, 586258, 586259, 586260, 586261, 586262, 586263, 586264, 586265, 586266, 586267, 586268, 586269, 586270, 586271, 586272, 586273, 586274, 586275, 586276, 586277, 586278, 586279, 586280, 586281, 586282, 586283, 586284, 586285, 586286, 586287, 586288, 586289, 586290, 586291, 586292, 586293, 586294, 586295, 586296, 586297, 586298, 586299, 586300, 586301, 586302, 586303, 586304, 586305, 586306, 586307, 586308, 586309, 586310, 586311, 586312, 586313, 586314, 586315, 586316, 586317, 586318, 586319, 586320, 586321, 586322, 586323, 586324, 586325, 586326, 586327, 586328, 586329, 586330, 586331, 586332, 586333, 586334, 586335, 586336, 586337, 586338, 586339, 586340, 586341, 586342, 586343, 586344, 586345, 586346, 586347, 586348, 586349, 586350, 586351, 586352, 586353, 586354, 586355, 586356, 586357, 586358, 586359, 586360, 586361, 586362, 586363, 586364, 586365, 586366, 586367, 586368, 586369, 586370, 586371, 586372, 586373, 586374, 586375, 586376, 586377, 586378, 586379, 586380, 586381, 586382, 586383, 586384, 586385, 586386, 586387, 586388, 586389, 586390, 586391, 586392, 586393, 586394, 586395, 586396, 586397, 586398, 586399, 586400, 586401, 586402, 586403, 586404, 586405, 586406, 586407, 586408, 586409, 586410, 586411, 586412, 586413, 586414, 586415, 586416, 586417, 586418, 586419, 586420, 586421, 586422, 586423, 586424, 586425, 586426, 586427, 586428, 586429, 586430, 586431, 586432, 586433, 586434, 586435, 586436, 586437, 586438, 586439, 586440, 586441, 586442, 586443, 586444, 586445, 586446, 586447, 586448, 586449, 586450, 586451, 586452, 586453, 586454, 586455, 586456, 586457, 586458, 586459, 586460, 586461, 586462, 586463, 586464, 586465, 586466, 586467, 586468, 586469, 586470, 586471, 586472, 586473, 586474, 586475, 586476, 586477, 586478, 586479, 586480, 586481, 586482, 586483, 586484, 586485, 586486, 586487, 586488, 586489, 586490, 586491, 586492, 586493, 586494, 586495, 586496, 586497, 586498, 586499, 586500, 586501, 586502, 586503, 586504, 586505, 586506, 586507, 586508, 586509, 586510, 586511, 586512, 586513, 586514, 586515, 586516, 586517, 586518, 586519, 586520, 586521, 586522, 586523, 586524, 586525, 586526, 586527, 586528, 586529, 586530, 586531, 586532, 586533, 586534, 586535, 586536, 586537, 586538, 586539, 586540, 586541, 586542, 586543, 586544, 586545, 586546, 586547, 586548, 586549, 586550, 586551, 586552, 586553, 586554, 586555, 586556, 586557, 586558, 586559, 586560, 586561, 586562, 586563, 586564, 586565, 586566, 586567, 586568, 586569, 586570, 586571, 586572, 586573, 586574, 586575, 586576, 586577, 586578, 586579, 586580, 586581, 586582, 586583, 586584, 586585, 586586, 586587, 586588, 586589, 586590, 586591, 586592, 586593, 586594, 586595, 586596, 586597, 586598, 586599, 586600, 586601, 586602, 586603, 586604, 586605, 586606, 586607, 586608, 586609, 586610, 586611, 586612, 586613, 586614, 586615, 586616, 586617, 586618, 586619, 586620, 586621, 586622, 586623, 586624, 586625, 586626, 586627, 586628, 586629, 586630, 586631, 586632, 586633, 586634, 586635, 586636, 586637, 586638, 586639, 586640, 586641, 586642, 586643, 586644, 586645, 586646, 586647, 586648, 586649, 586650, 586651, 586652, 586653, 586654, 586655, 586656, 586657, 586658, 586659, 586660, 586661, 586662, 586663, 586664, 586665, 586666, 586667, 586668, 586669, 586670, 586671, 586672, 586673, 586674, 586675, 586676, 586677, 586678, 586679, 586680, 586681, 586682, 586683, 586684, 586685, 586686, 586687, 586688, 586689, 586690, 586691, 586692, 586693, 586694, 586695, 586696, 586697, 586698, 586699, 586700, 586701, 586702, 586703, 586704, 586705, 586706, 586707, 586708, 586709, 586710, 586711, 586712, 586713, 586714, 586715, 586716, 586717, 586718, 586719, 586720, 586721, 586722, 586723, 586724, 586725, 586726, 58672



Şekil 9. 1-18. Aedeagus. 1. *Anthaxia (Cratomerus) sponsa* Kiesenwetter, 2. *A. (C.) hungarica* (Scopoli), 3. *A. (C.) diadema* (Fischer), 4. *A. (s.str.) turcomanica* Obenberger, 5. *A. (s.str.) nigricollis* Abeille de Perrin, 6. *A. (s.str.) bicolor* Faldermann, 7. *A. (s.str.) muliebris* Obenberger, 8. *A. (s.str.) hypomelaena* (Illiger), 9. *A. (s.str.) nitidula signaticollis* Krynicki, 10. *A. (s.str.) discicollis* Gory & Laporte, 11. *A. (Haplanthaxia) cichorii* (Olivier), 12. *A. (H.) millefolii* (Fabricius), 13. *A. (H.) rossica* (Daniel), 14. *A. (H.) niehuisi* Brandl, 15. *A. (H.) olympica* (Kiesenwetter), 16. *A. (Melanthaxia) caucasica* Abeille de Perrin, 17. *A. (M.) godeti* Gory & Laporte, 18. *A. (M.) nigrojubata nigrojubata* Roubal (Ölçek 1 mm).

11). İncelenen örnekler *Eryngium campestre* u
toplamıştır.

Anthaxia (s.str.) *muliebris* Obenb.

Dünyadaki Yayılışı: Afganistan, Ermenistan, Gürcistan, İran, İtalya, Japonya, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Suriye, Tadzhikistan, Türkiye, Uzak Doğu Asya, Yunanistan (27).

Türkiye'deki Yayılışı: (Agamemnon), Çetinbeli-Marmara (27).

İncelenen Materyaller: ARTVAN: 21.5.1997, 1 ; Yusufeli Altıparmak 5.7.1994, 1 ; INC 1 , 16.6.1996, 1 ; Pişkidağ 8.1.1993, 1 ; Oltu 2.7.1995, 1 , Anzavurlesi 5.7.1996, 1 ; Uzundere-Dikmen 9.6.1996, 1 ; Uzunköprü 2.7.1996, 1 ; 14.5.1996, 1 ; Uzundere-Dikmen 17.6.1995, 2 ; 9.6.1996, 3 . Şelale 9.6.1996, 1 . (Top) örnekləri sayısı: 68). İncelenen örnekler *Acmaea biebersteinii*, *A. millefolium*, *Carum carvi* ve *Daucus carota* ile diğer bazı yabancı otlar ve meyve ağaçları kenarlarındaki kısa boylu çalı formundaki bitkilerin yaprakları üzerinden toplamıştır.

Anthaxia (s.str.) *nigricollis* Abeille de Perrin, 1904

Dünyadaki Yayılışı: Türkiye (27, 126).

Türkiye'deki Yayılışı: Değişikliklerin belirtmeksizin Türkiye'de bulunması (95, 97, 105, 115, 126) [redacted] şiriciler, lokaliteyi [redacted] hâlini belirtmişlerdir.

İncelenen Materyal: [REDACTED] Landöke
1.7.1996, 2 , 1 , 230
17.6.1996, 3 , 4 , 155 (Toprak
sayısı: 10). İncelenen örnekleri [REDACTED] Çorum (Merkez)
etiketli olanları, *Pinus sylvestris*, Ültu etiketleri ise
Juniperus oxycedrus ağaçlarının alt kısımlarında yer alan
Achillea biebersteinii, *Allyssum murale*, *Anthemis* sp.,
Crepis sp. ve *Senecio vernalis* bitkileri üzerinden
toplannmıştır.

Anthaxia (Melanthaxia) nigrofasciata Roubal, 1913

Türkçe Yazarlar
Şavşat İresah (İzmir) 1991
Trabzon, 1991
Türkiye, 1991
(126, 1991)

İnceleme Mağara
21.6.1994 m, [REDACTED]
Ardanuç 24.6.1 [REDACTED]
1 , 650 [REDACTED]
1500 m, 8.7.1994 [REDACTED]
1 , 1500 [REDACTED] Gavşat
Yusufeli- [REDACTED] [REDACTED]
12.6.1994, 38 [REDACTED]
2 , , 700 ER [REDACTED]
30.5.1993, 1 , 1 [REDACTED]
Şenkaya-Turnali 25.5.1994 [REDACTED]
Uzundere-Dikyar 24.5.1994, 45 [REDACTED]
örnek sayı: 124). [REDACTED] [REDACTED]
Taraxacum officinale [REDACTED] [REDACTED]
toplanoğlu. Uzun [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
örnekler *Picea abies* [REDACTED] ağaçları [REDACTED] [REDACTED]
üzerinden alınmış [REDACTED] [REDACTED]

A. (M.) nigrojubata yanır [redacted] (27.6.1996, 2200 m, 25.7.1996, 1, 2, 5.8.1997, 1, 2250 m, 2100 m)'dan elde edildi. Bily tarafından A. (M.) nigrojubata incognita olarak teşhis edilmiştir. Örneklerin tamamı *Pinus sylvestris* ağaçları

Achillea biebersteinii, *Alyssum murale*, *Lythrum salicaria* ve *Tripleurospermum oreades* bitkilerinin çiçekleri üzerinden toplanmıştır. Her ne kadar buradaki örneksayısı 51 ise de yukarıda belirtilen bitkilerin içinde daha çok sayıda örnekler rastlanmıştır. Birbirse yüzlerce örnek toplanabilirdi.

Bily (135) tarafından Ilgaz Dağları'ndan tanımlanan bu alttürün yayılma alanı olarak Kızılırmak Nehri'nin batısı verilmekte ise de bunun doğru bir ifade olmadığı düşünülmektedir. Ilgaz Dağları ile Sarıkamış'ta örneklerin alındığı ormanlık alan habitat ve rakım yönünden benzerlik arzettmektedir. Bu çalışma ile bu alttürün Doğu [redacted] olgesi'nde [redacted] aya kommuştur. Ancak [redacted] unun daha da açıklık [redacted] nması açısından [redacted] eğişik yöreleri [redacted] örnek

planung |  Berufsbildungsforschung | BIBB

lyaya 114-146 tür
aeodera (s.str.) 146 tür
chlorostigma 146 tür
uncata Abeille de 146 tür
ta) flavofasciata 146 tür
kiye Buprestidae 146 tür
Ayrıca 28 tür
de 28 tür
medil 28 tür
Bütün 5 tür
ve 5 tür de Kars

Eurythyrea quercus, *Melanophila cuspidata* (Klug), *Phaenops cyanea* (F.), *Ptosima flavoguttata* (Illiger) ve *Scintillatrix gloriosa* (Marseul) türleri yörende nadir rastlanan türlerdir. Her bir tür sadece 1-4 örnekle temsil edilebilmiştir.

Anthaxia nigricollis, *A. turcomanica* Obenberger ve *A. niehuisi* endemik türlerdir.

İncelenen türlerden bazıları kültür bitkilerinde beslenmektedirler. *M. picta decastigma* alttürünün erginleri özellikle kesilerek yiğilmiş *Salix alba*, *S. nigra* ile *Populus nigra* ve *P. tremula*'nın gövdeleri üzerinden, larvaları ise aynı bitkilerin kabuk altlarından alınmıştır.

Teşekkür

Türlerin teşhis ve kontrollerinin yapılmasında büyük yardımlarını gördüğümüz Dr. Svatopluk Bily (Department of Entomology, National Museum, Kunratice 1, 148 00 Praha 4, Czech Republic) ile Dr. Mark G. Volkovitsh'e (Zoological Institute, Academy Of Sciences Russia, Gus-199034, Petersburg, Russia), yabancı otların teşhisini yapan Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Zengin'e (Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum), ağaç ve çalı formundaki bitkilerin teşhisini yapan Yrd. Doç. Dr. Hasan Yılmaz'a (Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum) ve projeye maddi destek sağlayan Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı'na teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Richards, O.W. and Davies, R.G., Imms' General Textbook of Entomology. Chapman and Hall A Halsted Press Book John Jiley and Sons, New York, p 1354, 1977.
2. Borror, D.J., DeLong, D.M. and Triplehorn, C.A., An Introduction to the Study of Insects. Hold, Rinehard and Winston, USA, p 827, 1981.
3. Booth, R.G., Cox M.L. and Madge R.B., Ile Guides to Insects of Importance to Man, 3. Coleoptera. Printed in the UK at the University Press, Cambridge, p 384, 1990.
4. Bily, S., The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, 10; p 109, 1982.
5. Obenberger, J., Une comparaison de la faune des Buprestides (Col.) de la faune Palearctique et Nearctique. Acta Univ. Carol. Biologica, 4(2): 153-168, 1958.
6. Lodos, N. ve Tezcan, S., Türkiye Entomolojisi V. Buprestidae (Genel, Uygulamalı ve Faunistik). Entomoloji Derneği Yayınları No: 8, E.Ü. Basimevi, İzmir, s 139, 1995.
7. Berker, A., Orman Koruma Bilgisi. T.C. Ziraat Vekaleti, Orman Mektebi, Yayımlı 1, Matbalı Ebuzziya, İstanbul, s 377, 1936.
8. Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S. ve Önder, E.P., Türkiye'de Tarım, Orman ve Evcil Hayvanlarda Hayvansal Kökenli Zararlı ve Yararlı Türlerin Bilimsel ve Türkçe isimleri. Tar.Orm. ve Köyişl. Bak. Mesleki Yayınlar, Yay. No: 8, Ankara 2 120, 1987.
9. Balachowsky, A., Davatchi, A. and Descarpentries A., "Famille des Buprestidae". In: Entomologie Appliquée à l'Agriculture. Tome I, p 564, 1962.
10. Powell, R.D. and Myers, J.H., The effect of *Sphenoptera jugoslavica* Obenb. (Col., Buprestidae) on its host plant *Centaurea diffusa* Lam. (Compositae). J. Appl. Ent., 106: 25-45, 1988.
11. Hasan, S., Biology of a Buprestis beetle, *Sphenoptera clarescens* (Col.: Buprestidae), from skeleton weed, *Chondrilla juncea*. Entomophaga, 23 (1): 19-23, 1978.
12. Sekendiz, O.A., Türkiye Hayvansal Kavak Zararlıları Üzerine Araştırmalar. Karadeniz Teknik Ü. Yay. No: 62, Orman Fak. Yay., No: 3, s 194, 1974.
13. Schimitschek, E., Türkiye Orman Böcekleri ve Muhiti (Çev.: A. Acatay). İ.Ü. Yay. No: 556, Orman Fak. Yay. No: 24, Hüsnüabiat Matbaais, İstanbul, s 471, 1953.
14. Çanakçıoğlu, H., Orman Entomolojisi (Özel Bölüm). İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yay. No: 3152, Orman Fak. Yay. No: 349, Matbaa Teknisyenleri Basimevi, İstanbul. (birinci baskı) s 536, 1983.
15. Hartmann, V.G. und Blank, R., Winterfrost, Kahlfrass und Prachtkäferbefall als Faktoren im Ursachenkomplex des Eichensterbens in Norddeutschland. Forst und Holz, 47. Jahrgang, 15: 443-452, 1992.
16. Tezcan, S., İzmir İlinde bulunan Sphenopterini, Buprestini ve Psilopterini (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae) tribus'lara bağlı türler üzerinde sistematik araştırmalar. Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bil. Enst. Bit. Kor. Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, s 162, 1990.
17. Tezcan, S., Kemalpaşa (İzmir) yöresi kiraz ağaçlarında zararlı Buprestidae (Coleaptera) familyası türleri üzerinde araştırmalar. Türk. Entomol. Derg., 19(3): 221.230, 1995.
18. Fairmaire, M.L., Notica sur les Coleopteres recoltes par M.J. Lederer sur le Bosz-Dagh (Asie Mineure). Annls. soc. ent. Fr., 35: 249-280, 1866.
19. Fairmaire, M.L., Coleopteres recoltes par M.L.'Abbe David a Akbes (Asie-Mineure). Annls. soc. ent. Fr., Oct. 1883, 1884.
20. Bodemeyer, H.E.V., Quer durch Klein-Asien in den Bulghar-Dagh, eine Naturwissenschaftliche Studien-Reise, Druck und Verlag; Die Druck und Verlagsaktien-Gesellschaft Vormals Dölter, Emmendingen, p 169, 1900.
21. Sahlberg, J., Coleoptera mediterranen orientalia. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar, 55(19): 272, 1912-13.

22. de Kerville, H.G., Recit sommarie du voyage et liste methodique des invertébrés et des vertébrés recoltes en Asie-Mineure. Voyage Zoologique D'Henri Gadeau de Kervilleen Asie-Mineure (April-Mai, 1912), Tome I, Paul Lechevalier, Paris, p 18, 1939.
23. Obenberger, J., Resultats de l'expedition scientifique zoologique du Museum National de Praha en Turquie. 423, Coleoptera IV, Buprestidae. Acta ent. mus. nat. Pragae, 29: 5-24, 1953.
24. Bodenheimer, F.S., Türkiye'de Ziraate ve Ağaçlara Zararlı Olan Böcekler ve Bunlarla Savaş Hakkında Bir Etüt (Çev. Naci Kenter). Bayur Matbaası, Ankara s 347, 1958.
25. Chararas, C., Les insectes du peuplier biologie, ecologie, ecologie, nocivite, methodes de protection. Ed. Librairie de la Faculte des Sciences, 7, rue des Ursulines, Paris, p 372, 1972.
26. Bily, S., New records and rare species of Buprestids from Bulgaria (Coleoptera, Buprestidae). Acta zoologica bulgarica, 13: 47-52, 1979.
27. Bily, S., Taxonomical and biological notes on Buprestidae from Turkey (Coleoptera). Türk. Bit. Kor. Derg., 8: 143-149, 1984.
28. Bily, S. and Brodsky, O., Taxonomical, biological and faunistical notes on Buprestidae and Cleridae from East Mediterranean (Coleoptera). Türk. Bit. Kor. Derg., 6: 185-194, 1982.
29. Curletti, G., Description d'une nouvelle espece de *Anthaxia* de la Turquie meridionale (Coleoptera, Buprestidae). Acta ent. bohemoslovaca, 81: 268-270, 1984.
30. Curletti, G. et Magnani, G., Una nuova *Anthaxia* della Turchia centrale (Coleoptera, Buprestidae). Riv. Piem. St. Nat., 6: 241-247, 1985.
31. Curletti, G. et Magnani, G., Quattro nuove specie di Buprestidi dell'area Mediterranea (Coleoptera, Buprestidae). Riv. Piem. St. Nat., 9: 137-148, 1988.
32. Novak, G., Das bis jetzt unbekannte Weibchen von *Anthaxia (Cratomerus) nupta* Kiesenwetter, 1857 (Coleoptera, Buprestidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österr. Entomologen, 36 (3/4): 119-120, 1984.
33. Novak, G., *Anthaxia* (s.str.) *herbertschmidi* n. sp., aus der Südtürkei (Coleoptera, Buprestidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österr. Entomologen, 44(1/2): 26-28, 1992.
34. Novak, G., *Anthaxia (Haplanthaxia) ovaciki* n. sp. eine neue *Anthaxia* der *cichorii* - Gruppe und Beschreibung des noch unbekannten & von *Philanthaxia rufimarginata* (Saunders, 1867) (Coleoptera, Buprestidae). Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt, Ver., 2(9), p 6, 1994.
35. Levey, B., Revision of the *umbellatarum* species group of *Anthaxia* (Coleoptera: Buprestidae). Systematic Entomology, 10: 299-306, 1985.
36. Niehuis, M., *Agrius adlbaueri* n. sp. aus der Türkei (Coleoptera, Buprestidae). Mitt. internat. entomol., Ver., 12(3/4) 57-66, 1987.
37. Niehuis, M., *Agrius oliveri* n. sp. aus der Türkei (Coleoptera: Buprestidae). Acta Coleopt., 5(2): 33-40, 1989.
38. Niehuis, M., *Meliboeus (Meliboeiodes) adlbaueri* n. sp. ein neuer Prachtkäfer aus dem Vorderen Orient (Coleoptera: Buprestidae). Mitt. internat. entomol., Ver., 13 (3/4): 121-132, 1989.
39. Niehuis, M., The *Melanophila*-species of the Near East, with the description of *Melanophila knoteki turica* n. ssp. (Coleoptera: Buprestidae). Zoology in the Middle East, 5: 43-61, 1991.
40. Niehuis, M., *Agrius sylviae* n. sp. ein neuer pistaciophoger *Agrius* aus dem Nahen Osten (Coleoptera: Buprestidae). Mitt. internat. entomol., Ver., 17(4): 209-217, 1992.
41. Svoboda, P., Two new species of *Anthaxia* from Turkey (Coleoptera, Buprestidae). Folia Heyrovskiana, 2(5): 63-67, 1994.
42. Acatay, A., İstanbul çevresi ve bilhassa Belgrad ormanındaki zararlı orman böcekleri, mücadeleleri ve işletme üzerine etkileri. Zir. Vek. Yük. Zir. Enst. Çal. Sayı: 142, s 163, 1943.
43. Acatay, A., Tatbiki Orman Entomolojisi. İ. Ü. Yay. No: 1359, Orman Fak. Yay. No: 133, Kutuluş Matbaası, İstanbul, s 182, 1969.
44. Acatay, A., Schädlinge von *Rosa damascena* Mill. in der Türkei. Anz. Schädlingsk, 43(4): 49-53, 1970.
45. Erdem, R., Sarıkamış Ormanlarında Entomolojik Müşahadeler. T. C. Tar. Bak. Orm. Gen. Müd., Sayı: 52, s 34, 1947.
46. Erdem, R., Ormanın Faydalı ve Zararlı Böcekleri. İ.Ü. Orman Fak. Yayınları, İ.Ü. Yay. No: 2078, Orman Fak. Yay. No: 217 s 227, 1976.
47. Erkiliç, S. ve Sümer, S., Eskişehir'de yeni bir zararlı böcek (*Sphenoptera carceli* Castelnau et Gory). Bit. Kor. Bült., 2: 27-29, 1952.
48. Defne, M. Ö., Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Göknarların Zararlı Böcekleri ve Mücadele Metodları. Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınevi, Seri No: 12, Sıra No: 105, İstanbul, s 228, 1954.
49. İleri, M. ve Ayfer, M., Antep Fıstığı (*Pistacia vera*) Zararlı ve Hastalıkları. Adana Zir. Muc. Enst. Yay. No: 41, s 41, 1956.
50. Çanakçıoğlu, H., Bursa Ormanlarında Entomolojik Araştırmalar. İ.Ü. Yay. No: 690, Orman Fak. Yay. No: 41, s 41, 1956.
51. Çanakçıoğlu, H., Orman Entomolojisi (Özel Bölüm). İ. Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ. Ü. Yay. No: 3623, Orman Fak. Yay. No: 412, İ. Ü. Basimevi ve Film Merkezi, İstanbul, (ikinci baskısı) s 458, 1993.
52. Nizamlıoğlu, K., Türkiye Meyve Ağacı Zararlıları ve Mücadelesi. Koruma Tar. İlaç. A. Ş. Neşri. No: 5, s 208, 1957.
53. Alkan, B., Mandelbaum schädlinge, ihre verbreitung und bekämpfung in der Türkei. Yb. Fab. Agric. Univ. Ankara, 1-9, 1963.
54. Tuatay, N., Isparta ve Burdur Bölgesi Yağ Güllerinin Başlıca Zararlıları, Kısa Biyolojileri ve Savaş Metotları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Zir. Muc. Enst. Müd., Sayı: 39, s 78, 1963.
55. Nizamlıoğlu, K. ve Gökmen, N., Türkiye'de Zeytine Zarar Veren Böcekler. Yenilik Basimevi, İstanbul, s 167, 1964.

56. Yüksel, H., Erzurum bölgesinde bulunan yeni korunga zararlısı (*Sphenoptera antiqua* Ill.). Bit. Kor. Bült., 6(2): 67-72, 1966.
57. Karagöz, O. ve Sekendiz, O., *Capnodis miliaris* Klug ve kavaklıarda tahrıbat yapan diğer *Capnodis* sp.'leri üzerinde araştırmalar. Kavaklıçılık Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni, 2: 107-110, 1968.
58. Özer, M. ve Duran, N., Orta Anadolu'da Yonca ve Korungada Zarar Yapan Böcek Türleri Üzerinde İlk Çalışmalar. A. Ü. Zir. Fak. Yayınları, 316. A. Ü. Basimevi, Ankara, s 78, 1968.
59. Besçeli, Ö., Büyükdüz Araştırma Ormanlarının Zararlı Böceklerinin Biyolojisi, Koruyucu Tedbirler ve Mücadelesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi No: 33, Ankara, s 94, 1969.
60. Ural İ., Işık, M. ve Kurt, A., Doğu Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerinde tesbit edilen böcekler üzerinde bazı incelemeler. Bit. Kor. Bült., 13(2) 55-66, 1973.
61. Sekendiz, O. ve Yıldız, N., *Melanophila picta* Pall.'ın Türkiye'deki biyolojisi, koruma ve savaş metotları. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni, 7: 157-177, 1972.
62. Sekendiz, O. ve Yıldız, N., Marmara ve Trakya Bölgesi'nde tahrıbatına rastlanılan *Agrilus ater* L.'in Türkiye'deki yayılışı, biyolojisi, zararları, koruma ve savaş metodları üzerine araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni, 7: 1-24, 1972.
63. Sekendiz, O.A., Doğu Karadeniz Bölümünün Önemli Teknik Hayvansal Zararlıları Üzerinde Araştırmalar. K.T.Ü. Genel Yayın No: 127, Orman Fakültesi Yayın No: 12, Trabzon, s 114, 1981.
64. Yıldız, N., *Capnodis miliaris* Klug. biyolojisi, koruma ve savaş metodları üzerine araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni, 9: 1-24, 1974.
65. Akman, K. ve San, S., Ege Bölgesinde zarar yapan *Capnodis* türleri üzerinde araştırmalar. Zir. Muc. Ar. Yill.: 21-23, 1975
66. Tosun, İ., Akdeniz Bölgesi iğne yapraklı ormanlarında zarar yapan böcekler ve önemli türlerin parazit ve yırtıcıları üzerinde araştırmalar. İ. Ü. Orman Fak. Derg., 26(2): 218-254, 1977.
67. Çanakçıoğlu, H., Selmi, E. ve Küçükosmanoğlu, A., İstanbul adalarında entomolojik tespitler. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 32 (1): 44-55, 1982.
68. Güler, N., Kavaklarımıza için büyük tehlike *Melanophila picta* Pall. (Kavak Süslü Böceği). Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Enstitüsü Dergisi. T. O. ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müd., İzmit, 57-69, 1984.
69. Kornoşor, S., Orman Park Süs Bitkileri Zararlıları. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Notu Yayınları No: 131, Adana, s 189, 1986.
70. Maçan, G., Güneydoğu Anadolu Sarıçam Ormanlarında Zarar Yapan Böcek Türleri, Önemlilerinin Tanınlmaları, Yayılışları ve Ekonomik Önemleri Üzerinde Araştırmalar. T. C. Tar.Orm. ve Köyşl. Bak. Diyarbakır Böl. Zir. Muc. Ar. Enst. Müd. Ar. Es. Ser. No: 5, s 82, 1986.
71. Yücel, M., Doğu Anadolu Sarıçam Ormanlarında Zarar Yapan Böcekler. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten 191: s 22, 1987.
72. Toros, S., Park ve Süs Bitkileri Zararlıları. Ankara Univ. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 363, Ankara, s 165, 1992.
73. Güler, N. ve Can, P., Orta ve Güneydoğu Anadolu'da Kullanılan Kavak Klonlarında Görülen Zararlılar. T. C. Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 166, s 24, 1994.
74. Özbek, H., Güçlü, Ş., Tozlu, G., Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Artvin illerinde kuşburnu bitkisinde zararlı olan Arthropoda türleri. Kuşburnu Sempozyumu Bildirileri, 5-6 Eylül 1996, Gümüşhane, 219-230, 1996.
75. Uygur, N., Başpinar, H., Şekeroğlu, E., Kornoşor, S., Özgür, A.F., Karaca, İ., Ulusoy, R. ve Kazak, M.R., GAP alanında zirai mücadele politikasına esas teşkil edecek zararlı ve yararlıların saptanması. Gap Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa, 99-119, 1195.
76. Özoglu, Ş. ve Uygur, N., Doğu Akdeniz Bölgesi'nde ağaçların kök, gövde ve dallarında zarar yapan böcek türlerinin saptanması. Türkiye III. Entomoloji Kongresi, 24-28 Eylül 1996, Ankara, 410-414, 1996.
77. Winkler, A., Catalogus Coleopterum Regionis Palaearcticae. XVIII, Dittesgasse 11, Wien, 620-663, 1924-32.
78. Obenberger, J., Coleopterum Catalogus. Vol. 12 (Eds. W. Junk and S. Schenkling), Pars: 84, Buprestidae I, Berlin, 1-212, 1926.
79. Obenberger, J., Sphenopterinorum revisionis prodromus II. De subgenere *Sphenoptera* Sol. s.str. (Col., Buprestidae). Sb. Ent. Odd. Nar. Mus. Praze, 40: 3-99, 1927.
80. Obenberger, J., Coleopterum Catalogus. Vol. 12 (Eds. W. Junk and S. Schenkling), Pars: 111, Buprestidae II, Berlin, 213-568, 1930.
81. Obenberger, J., Coleopterum Catalogus. Vol. 12 (Eds. W. Junk and S. Schenkling), Pars: 132, Buprestidae III, Berlin, 569-782, 1934.
82. Obenberger, J., Coleopterum Catalogus. Vol. 12 (Eds. W. Junk and S. Schenkling), Pars: 143, Buprestidae IV, Berlin, 782-934, 1935.
83. Obenberger, J., Coleopterum Catalogus. Vol. 13 (Eds. W. Junk and S. Schenkling), Pars: 152, Buprestidae V, Berlin, 935-1246, 1936.
84. Obenberger, J., Coleopterum Catalogus. Vol. 13 (Eds. W. Junk and S. Schenkling), Pars: 157, Buprestidae VI, Berlin, 1247-1714, 1937.
85. Niehuis, M., Beitrag zur Kenntnis der *Buprestis*-Arten des Nahen Ostens (Coleoptera: Buprestidae). Zoology in the Middle East, 4: 39-60, 1990.
86. Niehuis, M., Beitrag zur Kenntnis der *Coroebus*-Arten des Nahen Ostens (Coleoptera: Buprestidae). Acta Coleopt., 7 (2): 69-82, 1991.

87. Tezcan, S., İzmir İlinde bulunan Buprestidae (Julodinae, Polycestinae, Acmaeoderinae, Chalcophorinae, Chrysobothrinae, Agrilinae, Trachyinae) türleri üzerinde faunistik araştırmalar. Türkiye II. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 28-31 Ocak 1992, Adana, Entomoloji Derneği Yayınları No: 5, 737-746, 1992.
88. Lodos, N. ve Tezcan, S., Türkiye Buprestidae (Coleoptera) faunasının genel görünümü ve zoocoğrafi yönünden değerlendirilmesi. E. Ü. Zir. Fak. Derg., 29 (1): 15-22, 1992.
89. Niehuis, M. und Tezcan, S., Beitrag zur Kenntnis der *Agrilus*-Arten der Türkei (Coleoptera: Buprestidae). Mitt. internat. entomol., Ver., 18 (1/2): 1-53, 1993.
90. Tezcan, S., Contribution to the study of the genera *Acmaeodera* Eschscholtz and *Acmaeoderella* Cobos (Coleoptera, Buprestidae, Acmaeoderinae) of Turkey. Türk. Entomol. Derg., 19 (1): 69-79, 1995.
91. Tezcan, S., Some additional notes on Chalcophorini (Coleoptera: Buprestidae: Chalcophorinae) fauna of Turkey. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 32 (2): 9-16, 1995.
92. Tezcan, S., Notes on *Capnodis* Eschscholtz (Coleoptera: Buprestidae) fauna of Turkey. Ege Üniv. Ziraat. Fak. Derg., 32(2): 9-16, 1995.
93. Kismalı, Ş., Tezcan, S., Turanlı, F. ve Madanlar, N., Chrysomelidae ve Buprestidae (Coleoptera) familyalarına bağlı türlerin Gap Bölgesi'ndeki durumu. Gap Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa, 139-148, 1995.
94. Thery, A., Faune de France. Coleopteres Buprestides , 41. Librairie de la Faculte des Sciences, Paris, p 223, 1942.
95. Richter, A.A., Fauna SSSR. 13, 2. Zlatki (Buprestidae). I. Izd. AN SSSR, Moskova, Leningrad, p 255, 1949.
96. Richter, A.A., Fauna SSSR. 13, 4. Zlatki (Buprestidae) II. Izd. AN SSSR, Moskova, Leningrad, p 233, 1952.
97. Schaefer, L., Les Buprestides de France. Misc. Entomol. Paris, Supplement, p 511, 1952.
98. Bily, S., Krascovit-Buprestidae. In Zoologcke klice, Zoological Keys, Academia, Praha, p 112, 1989 (In Czech).
99. Volkovitsh, M.G., A review of Palaearctic groups of the tribe Acmaeoderini (Coleoptera, Buprestidae). Entomological Review, 58 (2): 78-99, 1979.
100. Bellamy, C.L., A catalogue of the higher taxa of the family Buprestidae (Coleoptera). Navors. nas. mus. Bloemfontein, 4 (15): 405-427, 1985.
101. Volkovitsh, M.G., The new data on synonymy of 6 species of Buprestid-beetles (Coleoptera, Buprestidae) of the tribe Acmaeoderini from the Transcaucasia. AH CCCP, 5 (43), 367-371, 1990 (In Russian).
102. Mühle, H., Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. Beitr. Ent., Berlin, 30(2): 369-383, 1980.
103. Volkovitsh, M.G., A catalogue of the tribe Acmaeoderini of the fauna of the USSR and adjacent countries. AH CCCP, T. 140, 16-43 , 1986 (In Russian).
104. Niehuis, M., Contribution to the knowledge of the Jewel Beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the Near East. Zoology in the Middle East, 3: 73-110 1989.
105. Curletti, G., I Buprestidi D'Italia. Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia, No. 19, p 318, 1994.
106. Raicanescu, A., Contributii la studiul faunistic și ecologic al buprestoideelor din Rezervația Biosferei Delta-Dunarii (Coleoptera: Buprestoidae). Bul. inf. Soc. lepid. rom., 6 (1-2): 105-125, 1995.
107. Sakalian, V., Studies on Buprestidae (Coleoptera) in the Sandanski-Petric and Goce Delcev valleys -Southwest Bulgaria. III. Zoogeographical characteristic. Acta zoologica bulgarica., 47, 35-41, 1994.
108. Volkovitsh, M.G., and Alexeev, A.V., Buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) from Kopetdagh and the adjacent regions of Southern Turkmenistan. Biogeography and ecology of Turkmenistan, 419-449, 1994.
109. Bily, S., Results of the Czechoslovak-Iranian entomological expeditions to Iran. Coleoptera, Buprestidae. Acta entb mus. nat., Pragae, 41: 29-89, 1983.
110. Volkovitsh, M.G., Two new species of the genus *Acmaeoderella* Cobos (Coleoptera, Buprestidae) from South West Asia. Entomological Review, 60 (4): 82-87, 1981.
111. Volkovitsh, M.G., New and little known Buprestid-beetles of the genus *Acmaeoderella* Cobos (Coleoptera, Buprestidae) from the Eastern Mediterranean. AH CCCP, T. 208, 43-63, 1989 (In Russian).
112. Solier, A. J.J., Essai sur les Buprestides. Annales de la Societe Entomologique de France, 2: 261-316, 1833.
113. Zabransky, P., Beitrage zur Faunistik Österreichischer Käfer mit Bemerkungen zur Ökologie und Biologie 2. Teil-Familie Buprestidae (Coleoptera: Buprestidae). Koleapt. Rundschau, 61: 139-156, 1991.
114. Penther, A. et Zederbauer, E., Resultats de l'expedition scientifique zoologique du Museum National de Praha en Turquie. 423, Coleoptera IV. Buprestidae. Acta ent. mus. nat. Pragae, 29: 5-24, 1905.
115. Hellrigl, K.G. Ökologie und Brutpflanzen europäischer Prachtkäfer (Coleoptera, Buprestidae). Z. angew. ent., 85: 167-191, 1978.
116. Kurosawa, Y., Reorganization of *Buprestis* and its allies (Coleoptera, Buprestidae). Kontyu, Tokyo, 56 (2): 261-279, 1988.
117. Mühle, H., Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. Beitr. Ent., Berlin, 34 (2) 425-426, 1984.
118. Obenberger, J., Revision der palaearktischen *Buprestis*-Arten (Col., Buprest.). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 31: 460-554, 1941.

119. Sparacio, I., Materiali per un catalogo di buprestidi di Sicilia (Coleoptera, Buprestidae). Naturalista sicil., S. IV, XIV (3-4), 71-76, 1990.
120. Yüksel, B., Türkiye'de ladını (*Picea orientalis* (L.) Link.)'nde zarar yapan böcekler ve bazı türlerin yırtıcı ve parazitleri üzerine araştırmalar. Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bil. Enst. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, s 222, 1996.
121. Erdem, R. ve Çanakçıoğlu, H., Türkiye Odun Zararluları. İ.Ü. Yayınları, No: 2336. Orman Fakültesi No: 241, İstanbul, Kısım Buprestidae, 35-42, 1977.
122. Güldürümreoğlu, S., İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Böcek ve Genel Zararlular Kataloğu (1928-1969). 1. Kısım Bölge Zir. Muc. Arş. Enst., Bornova, s 119, 1972.
123. Bily, S. and Bellamy, C.L., Comment on the proposed conservation of usage of the generic names *Melanophila* Escholtz, 1829 and *Phaenops* Dejean, 1833 (Insecta, Coleoptera). Bull. Zool. Nom., 52, 1: 70, 1995.
124. Gutowski, J.M. and Krolik, R., A review of the morphology, distribution and biology of Palaearctic species of the genus *Phaenops* Dej.. (Coleoptera: Buprestidae). Crystal, Series Zoologica, No: 3, p 88, 1996.
125. Gutowski, J.M., Changes in communities on longhorn and buprestid beetles (Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae) accompanying the secondary succession of the pine forests of Puszcza Białowieska. Fragmenta Faunistica, 38(20): 390-409, 1995.
126. Bily, S., World Catalogue of the Genus *Anthaxia* Eschscholtz, 1829 (Coleoptera: Buprestidae). Folia Heyrovskyana, Supplementum 2, p 190, 1997.
127. Serafim, R. and Raicanescu, A., Lista sepciiilor de Buprestoidea (Coleoptera) din colectia NICOLAE SAVULESCU de la Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucuresti. Bul. inf. Soc. lepid. rom., 6 (1-2): 123-144, 1995.
128. Niehuis, M., Taxonomisch-zoogeographische studien zum *Anthaxia-dimidiata*-Komplex (Coleoptera: Buprestidae). Mitt. internat. entomol. Ver. 15 (1/2): 41-64, 1990.
129. Bily, S., Taxonomic notes on *Anthaxia* (Coleoptera, Buprestidae) from South-Western Asia, with description of two new species. Acta ent. bohemoslovaca, 74: 275-282, 1977.
130. Bily, S., Taxonomic notes on *Anthaxia* (subgen. *Cratomerus*) from the Palaearctic region (Coleoptera, Buprestidae). Acta ent. bohemoslovaca, 77: 271-279, 1980.
131. Tuatay, N., Kalkandelen, A. ve Aysev, N., Nebat Koruma Müzesi Kataloğu (1961-1971). T.C. Tar. Bak. Zir. Mücb Zir. Kar. Gn. Md. Yay. Mes. Kit. Ser., s 119, 1972.
132. Brandl, P., *Anthaxia niehuisi* sp. n. eine neue *Anthaxia* aus der Türkei (Coleoptera, Buprestidae). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 36 (1): 14-16, 1987.
133. Obenberger, J., Etudes sur les especes du genre *Anthaxia* Eschsch. Acta Entom. Mus. Nat. Praha, 11: 171-249, 1938.
134. Bily, S., A revision of *Anthaxia* (*Melananthaxia*) *conradti* and *corsica* species-groups (Coleoptera, Buprestidae). Acta ent. bohemoslovaca, 81: 434-447, 1984d.
135. Bily, S., Variation and subspeciation in *Anthaxia* (*Melananthaxia*) *nigrojubata* Roubal (Coleoptera, Buprestidae). Acta ent. bohemoslovaca, 71: 318-321, 1974.