

## Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Tür, *Prozercon (s.str.) rafalskii* Blaszak, 1971 (Acari, Zerconidae)

Raşit URHAN

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 20100 Denizli-TÜRKİYE

Geliş Tarihi: 18.02.1997

**Özet:** Bu çalışmada, Türkiye faunası için yeni kayıt olan *Prozercon (s.str.) rafalskii* Blaszak, 1971' in örneklerimiz üzerinden gözden geçirilmiş tanımı ve özgün şekilleri verilmektedir.

Anahtar Sözcükler:*Prozercon (s.str.) rafalskii*, Acari, Yeni kayıt, Sistemmatik, Türkiye.

### ***Prozercon (s.str.) rafalskii* Blaszak, 1971, a new species for the fauna of Turkey (Acarı, Zerconidae)**

**Abstract:** In this study, *Prozercon (s.str.) rafalskii* Blaszak, 1971 is recorded for the first time from Turkey. Its description is revised from the collected specimens and given with drawings.

**Key Words:** *Prozercon (s.str.) rafalskii*, Acari, New record, Systematic, Turkey.

#### **Giriş**

*Prozercon (s.str.) rafalskii* türünün ilk tanımı 1971'de Blaszak tarafından Polonya'dan toplanan örneklerle göre yapılmıştır (1). Ülkemizde bugüne kadar *Prozercon* cinsinin *P.(s.str.) tragardhi* (Halbert, 1923), *P.(s.str.) fimbriatus* (C.L.Koch, 1839), *P. (s.str.) satapliae* Petrova, 1977, *P.(Plumatozercon) orhani* Urhan & Ayyıldız, 1995, *P.(Plumatozercon) kamili* Urhan & Ayyıldız, 1995, *P.(s.str.) demirsoyi* Urhan & Ayyıldız, 1995, *P.(s.str.) boyacii* Urhan & Ayyıldız, 1995, *P.(s.str.) luxtoni* Urhan & Ayyıldız, 1995, *P.(s.str.) artvinensis* Urhan & Ayyıldız, 1995 ve *P.(s.str.) turcicus* Urhan & Ayyıldız, 1995 olmak üzere toplam 10 tür kaydedilmiştir (2, 3, 4, 5, 6). Burada, Türkiye faunası için yeni olarak verilen tür ile beraber bu cinsin ülkemizden bilinen tür sayısı 11'e ulaşmaktadır.

#### **Materyal ve Metod**

Örneklerin toplanması, ayıklanması, preparasyonu ve saklanmasında daha önce kullanılan yöntemler izlenmiştir (2).

#### **Bulgular**

**Familya:** Zerconidae Canestrini, 1891

**Cins:** *Prozercon* Sellnick, 1943

**Tip türü:** *Zercon fimbriatus* C.L.Koch, 1839

**Tür:** *Prozercon (s.str.) rafalskii* Blaszak, 1971

**Dişİ** (Şekil 1 A, B)

Vücut 326 (317-340) / 242 (233-250)  $\mu\text{m}$  büyüklüğündedir.

Podonotum üzerindeki  $i_1$ ,  $z_2$  ve  $r_1-r_7$  kilları tüylü, geriye kalan kilların tamamı düzdür. Opistonotum üzerindeki  $R_1-R_8$  kilları kısa ve düz, geriye kalan kilların tamamı uzun ve tüylüdür.  $I_3$  killı  $I_4$  killının kaidesine kadar uzanır.  $I_5$  killı opistonotumun arka kenarına kadar uzanmaz.  $I_6-I_6$  kilları arasındaki mesafe 60  $\mu\text{m}$ 'dir.  $Z_4$  killı opistonotumun yan kenarına kadar uzanmaz.  $Z_5-Z_6$  kilları arasındaki mesafe 30  $\mu\text{m}$ 'dir.  $S_1$  killının kaidesi opistonotumun ön kenarına  $Z_1$  killının kaidesinden daha yakındır.  $S_2-S_4$  killarının uzunlıklarının yarısından fazlası opistonotumun yan kenarından dışarıya uzanır. Opistonotum üzerindeki kilların uzunlıklarını ve bu killar arasındaki mesafeler  $\mu\text{m}$  olarak aşağıda verilmiştir.

S1-12 (10-13)	Z1-17	I1-20
37 (33-40)	27 (23-30)	44 (43-47)
S2-28 (27-30)	Z2-15 (13-17)	I2-20
37 (33-40)	25 (23-27)	27 (23-30)
S3-28 (27-30)	Z3-15 (13-17)	I3-17
33 (30-37)	26 (23-27)	17 (13-20)
S4-28 (27-30)	Z4-15 (13-17)	I4-15 (13-17)
39 (33-47)	Z5-20	I5-14 (13-17)
		21 (20-23)
		I6-28 (27-30)


Podonotum ve opistonotumun deseni ile bu vücut bölgeleri üzerinde bulunan gözeneklerin konumları Şekil 1 A' gösterilmiştir.

Peritremal plağın şéki ve kıl düzeni cinsin tipik özelliğine uygundur. Adgenital plaklar yoktur. Ventro-anal plağın ön kenarında iki tane kıl vardır (Şekil 1 B).

#### ERKEK (Şekil 1 C, D)

Vücut 282 (273-290) / 200 (196-206)  $\mu\text{m}$  büyüklüğündedir.

Podonotum ve opistonotum üzerindeki kollar, gözenekler ve desen bakımından dışiye benzerdir. I6-I6



Şekil 1. *Prozercon (s.str.) rafalskii*: Dış; A. Vücut (üstten), B. Vücut (alttan). Erkek; C. Vücut (üstten), D. Vücut (alttan). Deutonimf; E. Vücut (üstten).

kılları arasındaki mesafe 53  $\mu\text{m}$ , Z<sub>5</sub>-I<sub>6</sub> kılları arasındaki mesafe ise 23  $\mu\text{m}$ 'dir. Opistonotum üzerindeki kılların uzunlukları ve bu kıllar arasındaki mesafeler  $\mu\text{m}$  olarak aşağıda verilmiştir.

S1-12 (10-13)	Z1-12 (10-13)	I1-16 (13-17)
26 (23-27)	23 (20-27)	36 (33-37)
S2-23	Z2-12 (10-13)	I2-16 (13-17)
28 (27-30)	21 (20-23)	19 (17-20)
S3-23	Z3-12 (10-13)	I3-14 (10-17)
27 (27-30)	20 (17-23)	16 (13-17)
S4-23	Z4-12 (10-13)	I4-12 (10-13)
32 (30-33)	32 (30-33)	15 (13-17)
	Z5-15 (13-17)	I5-12 (10-13)
		17 (13-20)
		I6-23

#### DEUTONIMF (Şekil 1E)

Vücut 270 (266-274) / 213 (210-216)  $\mu\text{m}$  büyüklüğündedir.

Podonotum üzerindeki i<sub>1</sub>, i<sub>3</sub>, r<sub>1</sub>, r<sub>3</sub>-r<sub>4</sub> ve r<sub>6</sub>-r<sub>7</sub> kılları uzun ve tüylü, geriye kalan kılların tamamı kısa ve düzdür. Opistonotum üzerindeki kenar kılları hariç bütün kıllar tüylüdür. I<sub>6</sub> ile S<sub>2</sub>-S<sub>4</sub> kılları diğerlerine göre daha uzundur. I<sub>6</sub>-I<sub>6</sub> kılları arasındaki mesafe 52  $\mu\text{m}$ , Z<sub>5</sub>-I<sub>6</sub> kılları arasındaki mesafe ise 20  $\mu\text{m}$ 'dir. Kenar kılları kısa ve düzdür. Podonotum ve opistonotum üzerindeki gözenekler konum itibarıyle ergin fertlerdeki gibidir.

#### Kaynaklar

- Blaszak, C., *Prozercon rafalskii* sp.nov. (Acari, Zerconidae) a new species of mite from Poland. Bull. Acad. Pol. Sci., Warschaw, 19 (1): 61-64, 1971.
- Urhan, R., Ayyıldız, N., Türkiye faunası için yeni bir *Prozercon* Sellnick, 1943 (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) türü. Doğa-Tr. J. of Zoology, 17 (1): 83-89, 1993.
- Urhan, R., Ayyıldız, N., Artvin ili zerkonidleri (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) üzerine sistematik araştırmalar-I. Doğa-Tr. J. of Zoology, 20 (3): 341-347, 1996.
- Urhan, R., Ayyıldız, N., Two new species of *Prozercon* (*Plumatozercon*) (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) from Turkey. J. Nat. Hist., 30: 795-802, 1996.
- Urhan, R., Ayyıldız, N., Three new species of the genus *Prozercon* Sellnick (Acari, Zerconidae) from Turkey. Acarologia, 37: 259-267, 1996.
- Urhan, R., Ayyıldız, N., Two new species of the genus *Prozercon* Sellnick (Acari, Zerconidae) from Turkey. Genus, 7 (3): 569-580, 1996.

Opistonotum üzerindeki kılların uzunlukları ve bu kıllar arasındaki mesafeler  $\mu\text{m}$  olarak aşağıda verilmiştir.

S1-10	Z1-10	I1-12 (10-13)
23 (20-27)	22 (20-23)	29 (27-30)
S2-27	Z2-10	I2-10
29 (27-30)	23 (20-27)	19 (17-20)
S3-27	Z3-10	I3-10
29 (27-30)	19 (17-20)	15 (13-17)
S4-27	Z4-9 (7-10)	I4-7
	22 (20-23)	15 (13-17)
	Z5-12 (10-13)	I5-7
		12 (10-13)
		I6-29 (27-30)

**İncelenen Örnekler:** Yeşilce köyü (Araklı, Trabzon), bahçelik, 200 m, 1.7.1995; findık (*Corylus avellana*) ve ormangülü (*Rhododendron* sp.) altından döküntü ve toprak örneği: 27 ♀♀, 12 ♂♂, 2 DN.

**Yayılışı:** Polonya.

Türkiye faunası için ilk kayittır.

#### Tartışma ve Sonuç

Örneklerimiz, şimdije kadar yalnız tip yerinden bilinen örneklerle genelde uygunluk göstermektedir (1). Bununla birlikte, tip örneğinde Z<sub>4</sub> kılı opistonotumun yan kenarına, I<sub>5</sub> kılı ise opistonotumun arka kenarına kadar uzanırken, örneklerimizde bu kıllar daha kısadır.