

山东大学

二〇一四年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码 308

科目名称 护理综合

第一部分：单项选择题（共 120 题，每题 1 分）

注意：本部分试题答案须填涂在红色答题卡上，填在其他位置无效。

1. 当噪声强度高达 dB 以上时，可造成高频率的听力损失，甚至永久性失聪。

- A 90 B 100 C 110 D 120

2. 紫外线有强大的杀菌作用，并可促进机体内部生成 。

- A 维生素 A B 维生素 B C 维生素 C D 维生素 D

3. 属于医院社会环境因素的是 。

- A 病室的湿度 B 医院的规章制度
C 病室的温度 D 病室的装饰

4. 为矫正子宫后倾或胎位不正可采用的体位是 。

- A 膝胸卧位 B 端坐位 C 截石位 D 侧卧位

5. 将患者置于头低足高位时，床尾应该用支托物垫高 cm。

- A 5~10 B 15~30 C 35~50 D 60~80

6. 临幊上给某些患者使用支被架的主要目的是：

- A 用于固定手腕及踝部 B 用于固定手腕、上臂
C 固定肩部，限制患者做起 D 起支撑作用，防止某些部位受压

7. 为昏迷患者做口腔护理时，以下正确的是 。

- A 协助患者漱口 B 从门齿至臼齿擦净牙齿各面
C 血管钳夹紧棉球，棉球干湿度适宜 D 用开口器时，从门齿处放入

8. 为预防压疮，患者平卧位时如需抬高床头，一般不应高于 。

A 15° B 20° C 25° D 30°

9. 紫外线用于物品表面消毒的有效距离是

- A 25~60cm B 25~55cm C 20~60cm D 20~55cm

10. 一把长 25cm 的无菌镊子浸泡在消毒剂中，液面应浸泡镊子的高度是

- A 8.5cm B 10.5cm C 12.5cm D 13.5cm

11. 医院感染中，最重要的感染源是

- A 已感染的患者 B 自身感染患者 C 动物感染源 D 医院环境

12. 下列哪项不属于灭菌方法：

- A 干烤 B 高压蒸汽 C 环氧乙烷气体 D 戊二醛

13. 对于高度危险性物品，必须选用的处理方法：

- A 低水平消毒 B 中水平消毒
C 高水平消毒 D 灭菌

14. 体温骤升多见于：

- A 休克 B 肺结核 C 急性感染 D 肝癌

15. 下列测量呼吸的方法中，错误的一项是：

- A 测量前向患者解释取得合作 B 呼吸异常者测 1min
C 成人、儿童计数 30s，得数乘以 2 D 观察患者胸腔起伏，一起一伏为一次

16. 影响热效的因素，下列哪项表述不正确

- A 湿热比干热穿透力强 B 个体对热的耐受性不同
C 热效应与热敷时间成正比 D 热效应与热敷面积成正比

17. 为患者进行鼻饲时，流质饮食的温度是：

- A 35~37°C B 38~40°C C 43~45°C D 50~55°C

18. 下列选项中不符合蛋白质生理功能的是：

- A 构成人体细胞组织 B 促进脂溶性维生素的吸收
C 维持血浆胶体渗透压 D 构成激素的成分

19. 低盐饮食指每日食盐摄入量不超过：

- A 1g B 2g C 5g D 10g

<p>20. 医院的饮食种类分三大类，下列叙述正确的一组是：</p> <p>A 基本饮食，治疗饮食，试验饮食 B 流质饮食，半流质饮食，普通饮食</p> <p>C 基本饮食，试验饮食，要素饮食 D 基本饮食，治疗饮食，要素饮食</p>	<p>B 执行中必须认真核对 C 医嘱必须有医生签名 D 护士执行医嘱后签全名</p>
<p>21. 某女性护士，50岁，经常于咳嗽、打喷嚏或跑步时出现尿液不自主的排出，你认为这种情况可能属于：</p> <p>A 功能性尿失禁 B 充溢性尿失禁</p> <p>C 急迫性尿失禁 D 压力性尿失禁</p>	<p>31. 临床患者最早出现的心理反应期是：</p> <p>A 否认期 B 愤怒期 C 忧郁期 D 协议期</p>
<p>22. 长期留置导尿管后发生尿液混浊、沉淀或结晶时，应：</p> <p>A 多饮水并进行、膀胱冲洗 B 膀胱内滴药</p> <p>C 热敷下腹部 D 经常更换卧位</p>	<p>32. 下列不属于濒死病人的临床表现是：</p> <p>A 嗜睡 B 呼吸衰竭 C 循环衰竭 D 肌肉震颤</p>
<p>23. 以下那种患者禁用生理盐水灌肠：</p> <p>A 肝昏迷患者 B 充血性心力衰竭患者 C 高热患者 D 长期便秘患者</p> <p>24. 大量不保留灌肠保留时间是：</p> <p>A 5~10min B 10~15min C 10~20cm D 15~20min</p>	<p>33. 护士与一糖尿病病人及家属共同研究和讨论病人出院后的饮食安排问题，此时其最主要的角色是</p> <p>A. 护理活动执行者 B. 护理管理者 C. 健康教育者 D. 健康咨询者</p>
<p>25. 静脉注射过程中，发现病人局部肿胀，疼痛，试抽有回血，可能的原因是：</p> <p>A 针头斜面紧贴血管壁 B 针头刺入皮下</p> <p>C 针头阻塞 D 针头斜面一半在血管外</p> <p>26. 长期反复输入大量库存血易发生那种并发症</p> <p>A 低血糖 B 高血钾 C 低血钾 D 碱中毒</p>	<p>34. 护理诊断所具有的显著特点是</p> <p>A. 对疾病本质的诊断 B. 类似医疗诊断 C. 从生物学观点考虑问题 D. 通过护理措施能解决的问题</p>
<p>27. 患者发生溶血反应时，为保护肾脏需碱化尿液，首选何种液体</p> <p>A 10%葡萄糖 B 林格液 C 4%碳酸氢钠 D 20%甘露醇</p> <p>28. 对于轻度缺氧患者，鼻导管给氧时，氧流量一般是：</p> <p>A 1~2L/min B 2~4L/min C 4~6L/min D 6~8L/min</p>	<p>35. 王某，男，78岁，咳嗽、咳痰30年，发热、咳黏液脓痰，喘息加重一周而入院。病人神志清楚，咳嗽无力，桶状胸，两肺叩诊呈过清音，听诊有湿性啰音。该病人最主要的一个护理诊断名称是</p> <p>A. 清理呼吸道无效 B. 发热 C. 有皮肤受损的危险 D. 营养失调</p>
<p>29. 洗胃时每次宜灌入的洗胃液量为：</p> <p>A 100~300 ml B 300~500 ml C 500~700 ml D 700~900ml</p> <p>30. 下列有关执行医嘱的原则的描述错误的选项是：</p> <p>A 医嘱均需即刻执行</p>	<p>36. 贯穿于护理程序始终的步骤是</p> <p>A. 评价 B. 评估 C. 诊断 D. 实施</p> <p>37. “有皮肤受损的危险：与活动能力降低有关”，这一护理诊断属于</p> <p>A. 现存的护理诊断 B. 潜在的护理诊断 C. 健康的护理诊断 D. 综合的护理诊断</p> <p>38. 关于首优问题的描述，以下正确的是</p> <p>A. 对生命威胁最大，需要立即采取行动予以解决的问题 B. 虽然不直接威胁生命，但对服务对象的身心造成痛苦，严重影响服务对象健康的问题</p>

A.全肺切除术后应避免过度侧卧，可采取 1/4 卧位	C.右下腹固定压痛点 D.阑尾穴压痛阳性
B.术后 24~36 小时血压常会有波动，应密切观察	28、某病人体重 60 kg，浅 II 度烧伤面积为 50%，烧伤后第一个 24H 补液量为： A.3500ML B.2500ML C.6500ML D.4500ML
C.有支气管瘘者，应取患侧卧位	29、继发性腹膜炎叙述错误的是： A.疼痛是最主要的临床表现 B.疼痛呈持续性、剧烈 C.腹压增加或变换体位时疼痛加剧 D.发病后体温骤升
D.全肺切除术后应保持胸腔闭式引流通畅	30、乳房癌根治术后护理措施不妥的是： A. 手术部位用弹力绷带包扎 7~10 日，使皮瓣紧贴胸壁 B. 注意观察皮瓣颜色及创面愈合情况 C. 不能在患侧上肢测血压、抽血、做静脉或皮下注射等 D. 术后 5 日开始做肩关节活动
22、关于食管癌术后的饮食护理不妥的是：	31、胸腔闭式引流拔管护理不妥的是： A.一般手术后 2~3 天，胸引流量逐渐减少至 24h<50ml，颜色转为淡血性，胸部透视两肺扩张良好，病人无发热、呼吸困难等征象时可给予拔管 B.拔管前嘱病人先深吸一口气，慢慢呼气，在其呼气末迅速拔管 C.拔管后应立即用凡士林纱布和厚敷料封闭胸壁伤口并包扎固定 D.拔管后 24 小时内密切观察病人是否有胸闷、呼吸困难、发绀、切口漏气、渗液、出血和皮下气肿等
A.术后应禁食并胃肠减压 3~4 日	32、脑室体外引流患者每日引流量不应超过 A.200ml B.300ml C.400ml D.500ml
B.停止胃肠减压后如吻合口瘘症状可开始进食	33、肾损伤患者绝对卧床休息时间为： A.1~2 周 B.2~4 周 C.4~6 周 D.6~8 周
C.术后 5~6 日可给全清流质，每日 6 次，每次 100ml	34、关于 T 管拔管护理不妥的是： A.如 T 管引流出的胆汁色泽正常，且引流量逐渐减少，可在术后 10 日左右试行夹管 1~2 日，夹管期间应注意观察病情 B.夹管 1~2 日如病人无发热、腹痛、黄疸等症状，可经 T 管作胆道造影 C.如造影无异常发现，在持续开放 T 管 24 小时充分引流造影剂后，再次夹管 2~3 日，
D.术后 1 周后病人如无特殊不适可进普食	
23、胆道感染性休克时处理原则正确的是：	
A.抗休克，血压回升后立即手术 B.大量抗生素控制感染后再手术	
C.抗休克同时，进行手术解除胆道梗阻 D.紧急手术，不用抗休克	
24、破伤风发病时，最先出现的症状是：	
A. 牙关紧闭，开口困难 B. 颈项强直	
C. 上肢屈曲，下肢伸直 D. 苦笑面容	
25、男性，56 岁。在无明显诱因下，反复出现无痛性血尿 2 个月，根据症状首先考虑的疾病是：	
A. 泌尿系结石 B. 前列腺增生 C. 泌尿系肿瘤 D. 泌尿系感染	
26、男性，60 岁，2 天前上腹持续性胀痛，12 小时后右下腹痛，阵发加剧，腹胀。近 4 年来常有饭前上腹灼痛，常在冬春季发作。查体：38℃，脉搏 120 次/分，血压 150/90mmHg。腹稍胀，满腹有压痛，但右下腹更明显，有肌紧张及反跳痛，肝浊音界存在，肠鸣音未听到，白细胞 $13 \times 10^9/L$ ，中性 88%。右下腹穿刺抽得黄色混浊液 2ml，镜检：脓细胞（++）高倍镜。最可能的诊断是：	
A.胃十二指肠溃疡穿孔 B.阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎	
C.急性胰腺炎 D.绞窄性肠梗阻	
27、诊断急性阑尾炎最有意义的体征是：	
A.结肠充气试验阳性 B.闭孔肌试验阳性	

病人仍无不适即可拔管

D. 如胆道造影发现有结石残留，则需保持 4 周以上，再作取石或其他处理

35、骨筋膜室综合征早期诊断最有意义的临床表现是：

A. 肢体远端动脉不能扪及 B. 皮肤苍白，感觉异常，肌肉瘫痪

C. 肢体持续、剧烈疼痛，进行性加剧，被动牵拉指、趾背伸，引起剧烈疼痛

D. 肢体高度水肿，皮肤有水疱形成

36、甲状腺手术，术前护理措施不正确的是：

A. 术前晚给予镇静剂保证良好睡眠 B. 脉搏控制在 90 次/分以下

C. 术前给予阿托品钠 0.5mg 肌注 D. 术前给予苯巴比妥钠 0.1g 肌注

37、胰头癌区别于壶腹周围癌的典型临床表现是：

A. 进行性加重的黄疸 B. 进行性上腹部胀痛

C. 进行性体重下降 D. 频繁恶心呕吐

38、Charcot 三联症（夏柯三联症）不包括：

A. 腹痛 B. 黄疸 C. 寒战高热 D. 恶心呕吐

39、前列腺增生症最早出现的症状是：

A. 排尿费力 B. 夜间尿频 C. 尿潴留 D. 血尿

40、溶栓疗法适用于深静脉血栓形成患者病程不超过：

A. 24 小时 B. 36 小时 C. 72 小时 D. 48 小时

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分）

41. 无菌持物钳可用于：

A. 消毒皮肤 B. 取无菌针头 C. 取无菌纱布

D. 取乙醇棉球 E. 换药

42. 压疮的病理分期包括_____。

A. 坏死溃疡期 B. 淤血红润期 C. 浅度溃疡期

D. 中度糜烂期 E. 炎性浸润期

43. 皮下注射部位有

A. 上臂三角肌外侧 B. 大腿前侧 C. 大腿外侧

D. 腹壁两侧 E. 后背

44. 下列哪些属于冷疗的禁忌症

A. 慢性炎症或深部化脓病灶 B. 血液循环障碍

C. 软组织或者扭伤的初期 D. 组织损伤、破裂

E. 昏迷、感觉异常者

45. 下列关于护患关系的叙述正确的是

A. 护患关系是一种人际关系

B. 护患关系是一种治疗关系

C. 护患关系是一种专业性的关系

D. 这需要护士单方面努力以建立良好的护患关系

E. 好的护患关系是优质护理的重要组成部分

46. 下列有关 Roy 适应模式与护理程序关系的描述，错误的是

A. 一级评估是刺激因素的评估

B. 二级评估是输出性行为的评估

C. 一级评估是判断人的输出性行为是否为适应性反应

D. 二级评估是收集病人的自我概念方面的资料

E. 通过一级评估可以识别主要刺激

47. 下列有关全身适应综合征（GAS）和局部适应综合征（LAS）内容的描述，错误的是

A. 只有 LAS 会出现应激反应的三个阶段，即警觉期、抵抗期和衰竭期

B. LAS 是指无论何种应激原作用于个体，个体都会产生相同的反应

C. 衰竭期时个体抵抗水平下降，会发生疾病或死亡

D. LAS 和 GAS 会出现相同的反应

E. 在警觉期，可以出现体重的增加

48. 按照 Orem 的自理理论，其护理系统包括

A. 全补偿系统	B. 部分补偿系统	55、RA 关节受累的主要特征有
C. 辅助-教育系统	D. 整体系统	A.对称性 B.周围性 C.持续性 D.进展性 E.急性
E. 部分系统		56、伤寒常见的肠道并发症有
49、急性心肌梗死病人抗凝治疗的禁忌症包括		A.坏死性肠炎 B.肠穿孔 C.肠套叠 D.肠出血 E.肠梗阻
A. 血压过高 B. 活动性溃疡 C. 严重肝肾功能不全		57、下列描述石膏绷带固定技术适应症正确的是:
D. 有出血倾向 E. 新近手术创面未愈合		A. 可用于四肢脊柱的骨折
50、慢性肾衰竭病人的治疗要点包括		B. 软组织如肌腱、神经、血管修复术后
A. 治疗原发疾病 B. 纠正加重肾衰竭的疾病		C. 因石膏通透性差，不宜用于化脓性骨髓炎及关节感染
C. 调节水、电解质和酸碱平衡失调 D. 控制并发的感染 E. 肾移植		D. 病理骨折
51、痛风急性关节炎期正确的描述是		E. 关节融合术后或肢体矫形术后
A. 突然发作的关节红肿热痛、功能障碍		58、男，46岁，右上腹部闷痛、消瘦3个月。既往有慢性乙型肝炎病史。体检：巩膜轻度黄疸，肝脏肋下6cm，质地硬，轻压痛，脾脏肋下2cm，移动性浊音阳性。AFP 380ug/L，ALT 432 u/L，PT 23秒(对照为13秒)。并发症可能有：
B. 可有关节腔积液，伴发热等全身反应		A. 肝性脑病 B. 上消化道出血 C. 下肢静脉曲张
C. 常在夜间发作，因疼痛而惊醒		D. 继发感染 E.肝癌结节破裂出血
D. 最易受累部位是跖关节		59、关于肠梗阻的临床表现，叙述正确的是：
E. 初次发作常呈自限性		A. 麻痹性肠梗阻表现为全腹持续性胀痛
52、脑出血常见的并发症包括		B. 绞窄性肠梗阻呕吐物为血性或棕褐色液体
A. 脑疝 B. 应激性溃疡		C. 蛔虫性肠梗阻表现以脐周阵发性腹痛为主
C. 继发感染 D. 中枢性高热		D. 不完全性肠梗阻可有多次少量排便、排气
E. 水、电解质紊乱		E. 高位肠梗阻呕吐频繁，腹胀较重；低位肠梗阻腹胀较轻
53、胸痛的护理措施包括		60、乳房癌根治术后预防患肢肿胀，护理指导正确的是：
A.患者取患侧卧位 B.用宽胶布于患者呼气末紧贴在患侧胸部		A.不在患肢测血压、抽血、注射
C.使用吗啡或哌替啶止痛 D.给予小剂量镇静剂		B.进行患肢制动
E.根据不同病因采取相应护理措施		C.下床活动时用吊带将患肢抬高于胸前
54、患者，男，50岁。肝硬化20余年，近半年来腹水加重，每日服用利尿剂，多次腹腔穿刺放腹水，今日下午意识模糊，出现扑翼样震颤，你认为该患者肝昏迷诱因是		D.肿胀严重者，可戴弹力袖促进淋巴回流
A.上消化道出血 B.高蛋白饮食 C.多次放腹水		E.平卧时患肢下方垫枕抬高10° ~15°
D.长期使用利尿剂 E.使用对肝有损害的药物		

三、问答题/病例分析题（共 5 题，每题 20 分）

1、病人因头部外伤需做 TAT 预防注射，注射毕出现胸闷气短，面色苍白，紫绀，烦躁不安，意识丧失。心率 120 次/分，脉弱，血压 70/45mmhg。你考虑病人出现了什么问题？应如何处理？

2、王某，女，32 岁。3 个月前无明显诱因出现泡沫尿、尿色加深，伴腰酸、乏力，并进行性加重。近日来劳累后出现双下肢浮肿，无尿频、尿急、尿痛。发病前无咽痛、发热，无高血压、糖尿病病史。

身体评估：体温 36.5°C，脉搏 86 次 / 分，呼吸 20 次 / 分，血压 120/75mmHg。神志清楚，皮肤黏膜无出血和黄染。两肺呼吸音正常。心率 85 次 / 分，律齐。腹平软，肝肋下未及，移动性浊音（-），双下肢水肿（+）。

实验室及其他检查：尿常规：尿蛋白（++++），24h 尿蛋白定量 7.1g，血液检查：血清清蛋白 18 g/L。肾功能检查：血肌酐 56 μ mol/L，血尿素氮 7.2mmol/L。

- (1) 该病人最可能的医疗诊断是什么？
- (2) 请解释该病人尿液改变的病理学基础。
- (3) 请提出该病人目前最主要的 2 个护理诊断 / 问题。
- (4) 健康指导的内容是什么？

3、患者，女，18 岁，学生，为减肥一年来一直食素，进食量控制在 2-3 两/天。1 个月前出现头昏、乏力、活动后心慌、气急。自诉上课时精力差，想睡觉，注意力不集中，学习成绩有所下降。化验检查：红细胞 $2.5 \times 10^12/L$ ，Hb 75g，白细胞 $3.9 \times 10^9/L$ ，血小板 $201 \times 10^9/L$ ，红细胞中央苍白区扩大，血清铁蛋白 9ug/L。身体检查：体温 36.7 °C，脉搏 104 次/分，呼吸 18 次/分，血压 95/80mmHg。面色苍白，皮肤干燥。请问：

- (1) 病人的医疗诊断是什么？
- (2) 主要护理诊断有哪些？
- (3) 应采取哪些护理措施？

4、甲状腺癌患者术后常见的并发症有哪些？请简要说明其临床表现及其原因。

5、患者男，57 岁，升结肠癌患者。一般情况良好，行右半结肠切除术，切除末端

回肠、盲肠、升结肠、右半横结肠，回肠与横结肠进行端端吻合。请针对该患者制定术后护理措施。