

电子科技大学

2014 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目： 692 数学物理基础

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一. 选择题（10 小题，每题 3 分，共 30 分，注：每题只有一个正确答案）

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} i^n$ 的敛散性 ()

- (A) 发散
- (B) 收敛
- (C) 条件收敛
- (D) 绝对收敛

2. 已知 $0 < a < 1$ ，那么幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{1+a^n} z^n$ 的收敛半径为 ()

- (A) $\frac{1}{a}$
- (B) a
- (C) 1
- (D) $2a$

3. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，则()

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 必收敛
- (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 必发散
- (C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 必收敛
- (D) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 必发散

4. 设 A, B 为同阶可逆矩阵, 则()

- (A) $AB = BA$
- (B) 存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T AC = B$
- (C) 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$
- (D) 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使得 $PAQ = B$

5. k 为整数, 则 $i^i =$ ()

- (A) $e^{-\frac{p}{2}i+2kp}$
- (B) $e^{-\frac{p}{2}+kp}$
- (C) $e^{-\frac{p}{2}i+kp}$
- (D) $e^{-\frac{p}{2}+2kp}$

注: . 质量为 m 的非相对论性粒子在平面中运动, 它的运动由极坐标 r, q 以及对时间的导数 \dot{r}, \dot{q} 共同描述。其势能为 $U = kr^2$, 其中 k 为常数。请解答 6,7 题

6. 下列选项中为描述此粒子拉格朗日量的是? ()

- (A) $L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{q}^2) - kr^2$
- (B) $L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \dot{q}^2) + kr^2$
- (C) $L = \frac{1}{2}m(\dot{q}^2 + r^2\dot{r}^2) - kr^2$
- (D) $L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r\dot{r}\dot{q} + r^2\dot{q}^2) - kr^2$

7. 下列的选项中哪一项一直为常数? ()

- (A) $m(\dot{r}^2 + r^2\dot{q}^2)$
- (B) $mr^2\dot{q}^2$
- (C) $mr\dot{q}$
- (D) $mr^2\dot{q}$

注：自由空间中火箭的运动方程可写为

$$m \frac{dv}{dt} + u \frac{dm}{dt} = 0$$

其中 m 为火箭的质量， v 为其速度， t 为时间， u 是一个常数。请解答 8,9 题

8 其中常数 u 代表了()

- (A) 火箭在 $t=0$ 时的速度
- (B) 火箭在其静止参考系中的瞬时速度
- (C) 火箭排出燃料相对于火箭的速度
- (D) 火箭排出燃料在静止参考系的速度

9. 当速度 v 为 m 的函数时，此运动方程可以求解。假设火箭在出发时 $v=0$ ， $m=m_0$ ，则方程的解 v 为()

- (A) $u \exp(m_0/m)$
- (B) $u \sin(m_0/m)$
- (C) $u \ln \frac{m_0}{m(t)}$
- (D) 以上答案都不是正确的解

10. 设 $z \in C$ 且 $|z| \leq 1$ ， a 为复数，则函数 $f(z) = |z^n + a|$ 的最大值为()

- (A) $1+|a|$
- (B) 1
- (C) 2
- (D) $|1+a|$

二. 填空题 (10 个空, 每空 3 分, 共 30 分)

11. 计算积分 $\int_C z dz = ()$, 其中 C 为从原点到点 $3+4i$ 的直线段。


12. 计算积分 $\int_{|z|=2} \frac{1}{z^2-1} dz = ()$, (注: 其中积分路径是绕原点为圆心, 2 为半径的圆逆时针方向)。

13. 在下列场中运动时动量 P 和角动量 M 的哪些分量守恒?


- (a) 无限大均匀平面场(无限大平面为 xy 平面) ()
- (b) 无限长均匀圆柱场(圆柱轴为 z 轴) ()
- (c) 无限长均匀棱柱场(棱边平行于 z 轴) ()
- (d) 两个点场(两个点位于 z 轴上) ()
- (e) 无限大均匀半平面场(无限大半平面是 xy 平面上以 y 轴为界的) ()
- (f) 均匀圆锥场(圆锥轴为 z 轴) ()
- (g) 均匀圆环场(圆环轴为 z 轴) ()
- (h) 无限长均匀圆柱形螺旋场(绕螺旋轴 z 轴旋转, h 为螺距) ()

三. 简答题 (2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分)

14. 有一个孤立的容器, 被分成左右两半。起初左半部装有温度为 T_0 的理想气体, 右半部是空的。如果在隔板上开一个小孔, 求达到平衡时的温度。并说明原因。



15. 一理想气体起初被限制在体积为 $V_1 + V_2$ 的绝热容器 V_1 部分, 容器的剩余部分是空的。当隔板抽调后, 气体膨胀而充满真个容器。如果气体的初始温度为 T , 求它的最终温度。并说明原因。



四. 计算题 (4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分)

16. 用复数理论证明:

$$\sin q + \sin 2q + \sin 3q + \dots + \sin nq = \frac{\cos \frac{q}{2} - \cos(n + \frac{1}{2})q}{2 \sin \frac{q}{2}} \quad .$$

17. 黑体辐射。(a) 推导麦克斯韦关系 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$,

(b) 麦克斯韦从他的电磁场理论发现, 各向同性的辐射场的压强 p 等于能量密度 $u(T)$ 的 $\frac{1}{3}$,

即:

$$p = \frac{1}{3}u(T) = \frac{1}{3} \frac{U(T)}{V} \quad (V \text{ 为 空 腔 体 积}),$$

用热力学第一定律及第二定律及(a)中结果证明:

$$u = \frac{1}{3}T \frac{du}{dT} - \frac{1}{3}u$$

(c) 解此方程得到 u 对 T 的斯特番(Stefan)定律。

18. 将函数 $f(z) = \frac{z}{z+1}$, 在 $|z-1| < 2$ 内展开成幂级数, 其中 z 为复数。

19. 考虑下面的厄米矩阵

$$T = \begin{pmatrix} 2 & i & 1 \\ -i & 2 & i \\ 1 & -i & 2 \end{pmatrix}$$

(a) 计算 $\det(T), \text{Tr}(T)$ 。

(b) 根据 $\det(T) = I_1 I_2 \mathbf{L} I_n, \text{Tr}(T) = I_1 + I_2 + \mathbf{L} + I_n$, 求 T 的本征值; 验证它们的和与积同

(a)中结果相同。写出 T 的对角形式。

(c) 求 T 的本征矢, 并在简并区, 构造两个线性无关的本征矢。使它们正交, 并验证它们都和第三个本征矢正交。(三个本征矢都需要归一化)

(d) 构造幺正矩阵 S , 使 T 对角化, 证明相似变换 S 使 T 变换成适当的对角形式。