

病案(四)

李某，女，28岁，已婚。因停经46天，突发右下腹痛3小时，于2006年3月26日急诊入院。

患者平素月经规律，曾有人流史3次，用药膜避孕。末次月经2006年2月10日，停经后无早孕反应，就诊前5日自测HCG(试纸)阴性，以为是月经推后，未到医院就诊。3小时前，无明显原因突发右下腹剧痛，呈撕裂样，伴头昏欲厥。就诊时神志清楚，述下腹疼痛，头昏心悸，面色苍白、冷汗淋漓、气短懒言。

病案(四)

体查: P: 120次/分, BP: 75/50mmHg, R: 24次/分, T: 36℃。心肺无明显异常, 腹部压痛反跳痛阳性, 尤以右下腹为著, 腹肌稍紧张,
移浊阳性。

妇查: 外阴: 未见异常

阴道: 通畅, 少量血性分泌物
后穹窿饱满。

宫颈: I度糜烂, 举痛阳性

宫体: 后位, 稍软, 不大, 活动
稍差, 无明显压痛

附件: 右侧附件压痛明显, 未及明
显包块.

病案(四)

B超：提示盆腔积血，右附件区可疑低回声包块

后穹窿穿刺：抽出3毫升不凝血液。

血 β -HCG：1500 U/L

血常规：HB 9g/L，WBC $12 \times 10^9 / L$ ，GR 78%，
血小板 $21 \times 10^9 / L$ 。

提 问 :

- 病史特点?
- 中医诊断?
- 西医诊断?
- 临床如何治疗?