

扬州大学

2019年硕士研究生招生考试初试试题 (A 卷)

科目代码 308 科目名称 护理综合

满分 300

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、单项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出一个正确答案，并将其代码填在答题纸上，每小题 1.5 分，共 90 分）

1. 类风湿关节炎 95% 以上患者有怎样的表现
A. 关节痛 B. 晨僵 C. 关节肿胀
D. 关节畸形 E. 功能障碍
2. 少量咯血是指患者 24 小时内的咯血量小于
A. 10ml B. 50ml C. 100ml D. 200ml E. 300ml
3. 诊断慢性阻塞性肺疾病的必备条件是
A. 完全可逆的气流受限 B. 不完全可逆的气流受限
C. 可逆的气流受限 D. 不可逆的气流受限
E. 完全气流受限
4. 当病人发生气胸后，气体可随呼吸自由进出胸腔，气胸侧胸膜腔内压在 0cmH₂O 左右，据此可以判断该病人发生的气胸为
A. 闭合性气胸 B. 交通性气胸 C. 张力性气胸
D. 原发性气胸 E. 局限性气胸
5. 患者男性，30 岁，常常在晨起及晚间躺下时咳大量脓痰，伴少量鲜血，且痰液放置后分层，可能是
A. 慢性支气管炎 B. 肺癌 C. 肺结核
D. 支气管扩张症 E. 肺气肿
6. 心功能不全患者水肿明显，一般每天液体入量控制在
A. 1500ml B. 500ml C. 3000ml
D. 2000ml E. 不必严格限制
7. 患者男性，因急性心肌梗死入院治疗，病情不稳定，出现哪项心律失常时需警惕室颤的发生
A. 心房颤动 B. 短阵性室性心动过速 C. 室上性心动过速
D. 窦性心动过缓 E. 一度房室传导阻滞
8. 患者女性，44 岁，因高血压，遵医嘱予口服卡托普利 50mg，一日 3 次，服药第二天，起床时感到眩晕、恶心，此时护士迅速给患者
A. 半卧位休息 B. 平卧抬高下肢 C. 坐位并吸氧
D. 饮温开水少许 E. 饮糖水少许
9. 不符合冠心病心绞痛的特点是
A. 在体力活动或情绪激动当时发作

- B. 部位在胸骨体中上段的后面 C. 呈压榨样疼痛
 D. 有压迫感及紧缩感 E. 常放射至右肩、右臂内侧
10. 肝性脑病最早出现的表现是
 A. 昏睡 B. 扑翼样震颤 C. 性格和行为异常
 D. 脑电图异常 E. 病理反射
11. 乙肝肝硬化失代偿期病人，胃镜示：食管胃底静脉曲张，该病人饮食上应该避免
 A. 进食植物性蛋白 B. 进食动物性蛋白 C. 进食谷类食物
 D. 进食含钾、含钠的食物 E. 坚硬粗糙的食物
12. 孔某，男，50岁，5天前服用自行煎制的中药后出现头晕、恶心、呕吐，尿量100ml/d，诊断为急性中毒，急性肾衰竭。该病人此时最重要的护理措施是
 A. 吸氧 B. 卧床休息 C. 保证总热量的摄入
 D. 限制蛋白质的摄入 E. 控制水、钾的摄入
13. 慢性粒细胞白血病患者最突出的体征是
 A. 低热 B. 多汗或盗汗 C. 脾肿大 D. 体重减轻 E. 淋巴结肿大
14. Graves病最严重的并发症是
 A. 甲状腺危象 B. 严重浸润性突眼 C. 周期性麻痹
 D. 甲亢性心脏病出现右心衰竭 E. 抗甲状腺药物所致严重肝损害
15. 患者男性，62岁。因肺炎用抗生素连续治疗，近日发现口腔粘膜有白色附着物，用棉签拭去附着物可见出血。考虑口腔病变是
 A. 维生素缺乏 B. 凝血功能障碍 C. 铜绿假单胞菌感染
 D. 病毒感染 E. 真菌感染
16. 男性，20岁，因肺炎合并右侧脓胸，多次胸膜腔穿刺，抽出脓液较为稠厚，发热等感染中毒症状难控制。应采取的治疗方法是
 A. 继续胸穿抽脓，注入敏感抗生素 B. 早日剖胸手术
 C. 更换胸穿部位抽脓 D. 胸腔闭式引流术，全身用敏感抗生素
 E. 继续胸穿抽脓，全身用敏感抗生素
17. 闭合性胸部损伤病人出现极度呼吸困难并有严重的皮下气肿，首先考虑为
 A. 肺损伤 B. 多根多处肋骨骨折 C. 张力性气胸
 D. 血胸 E. 创伤性窒息
18. 支气管扩张病人最主要的临床表现是
 A. 咳痰、咯血，反复呼吸道和肺部感染 B. 干咳、发热、盗汗
 C. 慢性咳嗽、持续性胸痛 D. 呼吸困难、胸闷气促
 E. 贫血、杵状指
19. 目前常用于乳腺癌普查的检查是
 A. B超 B. 钼靶X线摄片 C. 放射性核素扫描
 D. 针吸细胞学检查 E. 活组织冰冻切片
20. 甲状腺手术发生甲状腺危象主要是
 A. 硫氧嘧啶类药物服用过多 B. 碘剂准备时间不够
 C. 甲亢症状术前未能很好控制 D. 手术过度刺激，出血多
 E. 甲状腺切除不够
21. 王先生，53岁。发生消化道出血，精神紧张，烦躁不安，面色苍白，尿量减少，血压

- 下降。首先应给予的处理是
A. 升压药维持血压 B. 静脉补液 C. 利尿剂
D. 强心药物 E. 吸氧、保暖
22. 张先生，77岁。高血压数年，近月来睡眠不佳，排尿困难，体重下降，且有腹部不适感，左侧腹股沟区出现肿块并逐渐增大，可进入阴囊，考虑该病人可能是腹股沟疝，与发病有关的因素是
A. 高血压数年 B. 睡眠不佳 C. 排尿困难
D. 腹部不适 E. 体重下降
23. 主动脉瓣狭窄时心肌耗氧量增加的主要原因
A. 左心室肥厚 B. 右心室肥厚 C. 心室肌肥厚
D. 心房肌肥厚 E. 静脉充血
24. 男性，41岁，在ERCP检查后出现腹部持续性疼痛，血清淀粉酶升高，应考虑
A. 急性胆管炎 B. 急性胃炎 C. 急性肠炎
D. 急性胰腺炎 E. 急性胆管梗阻
25. 符合休克代偿期临床表现的特点的是
A. 血压下降，脉压显著缩小，心率加快，尿量减少
B. 血压下降，脉压轻度缩小，心率加快，尿量减少
C. 血压正常，脉压无变化，心率加快，尿量正常
D. 血压轻度降低，脉压无变化，心率加快，尿量减少
E. 血压正常或稍升高，脉压缩小，心率加快，尿量正常或减少
26. 小脑幕切迹疝出现一侧瞳孔散大，其损害部位是
A. 大脑皮层 B. 丘脑 C. 中脑 D. 脑桥 E. 延髓
27. 王某，男，30岁，下肢急性蜂窝织炎伴全身化脓性感染，需抽血行血培养及抗生素敏感试验，抽血的最佳时间应是
A. 高热时 B. 发热间歇期 C. 静脉滴注抗生素时
D. 寒战时 E. 抗生素输入后
28. T管拔除前，夹管观察的内容包括
A. 体温、血压、意识 B. 腹痛、血压、体温
C. 腹痛、呕吐、体温 D. 黄疸、血压、意识
E. 腹痛、体温、黄疸
29. 男性，22岁，交通事故后疑有肾损伤。为尽快明确诊断，首选的辅助检查是
A. 血常规 B. 尿常规 C. 腹部X线检查
D. B超 E. 排泄性尿路造影
30. 男，58岁，因进行性吞咽困难4个月就诊入院，经食管镜检查示食管中段6cm长的管腔狭窄，病理报告为鳞癌II级。查体：锁骨上无肿大淋巴结、无声嘶。手术后最严重的早期并发症有
A. 胸膜腔感染 B. 反流性食管炎 C. 吻合口瘘
D. 吻合口狭窄 E. 肺不张或肺感染
31. 周先生，48岁，诊断为“肺结核”。消毒其床头柜应用
A. 日光曝晒4h B. 臭氧灭菌灯照射20min
C. 含有效氯0.2%的消毒液喷洒60min D. 含有效氯0.2%的消毒液擦拭15min E. 84消毒液擦拭5min
32. 护士在为HBsAg阳性患者拔针时，患者突然躁动被针扎伤，该护士的HBsAg阴性且未注射乙肝疫苗，则应注射

- A. 乙肝免疫球蛋白 B. 乙肝疫苗 C. 乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗
D. 无需注射疫苗 E. 注射胎盘球蛋白

33. 以下化学性损伤的防范措施不妥的是
A. 熟悉各种药物应用知识 B. 严格执行药物管理制度和药疗原则
C. 进行药疗时，严格执行“三查七对”
D. 注意药物的配伍禁忌，及时观察患者用药后的反应
E. 为避免患者擅自用药，严禁向患者及家属讲解用药的有关知识

34. 下列关于床上擦浴的叙述不正确的是
A. 天冷时可在被内操作 B. 擦洗眼部时由外眦向内眦
C. 为患者脱上衣时，先脱近侧后脱远侧
D. 擦洗时注意防止浸湿床单 E. 15~30min 内完成

35. 下列与睡眠无关的表现是
A. 血压下降 B. 瞳孔散大 C. 呼吸变慢
D. 心率减慢 E. 尿量减少

36. 患者，男，65岁，因过量服用巴比妥类药物而中毒，患者出现潮式呼吸。潮式呼吸的特点是
A. 呼吸暂停，呼吸减弱，呼吸增强反复出现
B. 呼吸减弱，呼吸增强，呼吸暂停反复出现
C. 呼吸浅慢，逐渐加快加深再变浅慢，呼吸暂停后，周而复始
D. 呼吸深快，呼吸暂停，呼吸浅慢，三者交替出现
E. 呼吸深快，逐步浅慢，以至暂停，反复出现

37. 患者，女，75岁。呼吸困难，给予氧气吸入，吸入的氧浓度为33%，每分钟的氧流量是
A. 2L B. 3L C. 4L D. 5L E. 6L

38. 患者，男，34岁。测量血压，血压值为132/88mmHg 属于
A. 收缩压偏高，舒张压偏低 B. 收缩压偏低，舒张压偏高
C. 理想血压 D. 正常血压
E. 正常高值

39. 患者，女，50岁。诊断为“菌痢”。护士测量体温时得知其5min前饮过开水，为此应
A. 嘱其用冷开水漱口后再测量 B. 参照上次测量值记录
C. 改测直肠温度 D. 暂停测一次
E. 告知患者30min后再测口腔温度

40. 护士给一名肠造瘘患者注入要素饮食，她注入时饮食的温度宜为
A. 37℃ B. 38~39℃ C. 39~40℃ D. 40~41℃ E. 41~42℃

41. 肛管排气时，其肛管插入肛门约
A. 7~10cm B. 10~15cm C. 10~20cm
D. 12~15cm E. 15~18cm

42. 对尿失禁患者的护理中错误的一项是
A. 指导患者行盆底肌锻炼 B. 女患者可采用橡胶接尿器
C. 对长期尿失禁患者可采用一次性导尿术
D. 嘱患者多饮水，促进排尿反射 E. 多用温水清洗会阴部

43. 患者，因直肠癌住院，遵医嘱做肠道手术前的肠道清洁准备，护士正确的做法是
A. 行大量不保留灌肠一次，排除粪便和气体
B. 行小量不保留灌肠一次，排除粪便和气体

- C. 行保留灌肠一次，刺激肠蠕动，加强排便
D. 反复多次行大量不保留灌肠，至排出液澄清为止
E. 采用开塞露通便法，排除粪便和气体
44. 接种结核菌素的部位是（ ）。
A. 前臂内侧下段 B. 三角肌上缘
C. 上臂三角肌 D. 前臂外侧
E. 三角肌下缘
45. 输液中发生肺水肿时吸氧需用 20%~30% 的酒精湿化，其目的是
A. 使患者呼吸道湿润 B. 使痰液稀薄，易咳出
C. 消毒吸入的氧气 D. 降低肺泡表面张力
E. 降低肺泡泡沫表面张力
46. 静脉输液过程中发生空气栓塞的致死原因是
A. 空气栓塞在主动脉入口 B. 空气栓塞在肺动脉入口
C. 空气栓塞在上腔动脉入口 D. 空气栓塞在下腔动脉入口
E. 空气栓塞在肺静脉入口
47. 患者，男，45岁，有溃疡病史，近日来上腹部疼痛加剧，需做大便潜血试验。检验前三天该患者可以选择的一组食物是
A. 酱牛肉、卷心菜 B. 炒猪肝、油菜
C. 豆腐、菜花 D. 红烧猪肉、菠菜
E. 小白菜、猪血汤
48. 下列关于血标本采集方法的描述错误的是
A. 血清标本应避免震荡，防止溶血
B. 全血标本采集后注入抗凝管轻轻摇匀
C. 作二氧化碳结合力测定时，用普通抗凝管，测定结果偏高
D. 严禁在输血针头处采集血标本
E. 取下针头，将血液沿管壁注入标本容器内避免破坏血细胞
49. 患者，男，56岁，胃癌末期住院，入院后采用氧吗啡口服给药镇痛。该药用药后主要不良反应不包括
A. 便秘 B. 恶心、呕吐 C. 血小板减少
D. 直立性低血压等 E. 低血压眩晕
50. 患者，男，28岁，不明原因急性腹痛，护士判断该患者的疼痛程度为“甚痛”的依据是
A. 似痛非痛 C. 疼痛明显、较重、心跳加快
B. 疼痛轻微、范围局限 D. 疼痛剧烈、痛反应剧烈
E. 疼痛明显、心跳减慢
51. 患者，昏迷3天，眼睑不能闭合，护理眼部首选的措施是
A. 按摩双眼睑 B. 热敷眼部
C. 干纱布遮盖 D. 滴眼药水
E. 用生理盐水纱布遮盖
52. 患者，即将行胃大部切除术，术前医嘱：阿托品 0.5mgHst，护士首先应做的是
A. 将其转抄至长期医嘱单上 B. 将其转抄至临时医嘱单和治疗单上
C. 在该项医嘱前划蓝钢笔“√”标记
D. 即刻给患者皮下注射阿托品 0.5mg
E. 转抄至交班报告上，以便下一班护士查阅
53. 护士在完成独立性及合作性护理功能，从法律及专业角度来讲下列哪项是不正确的

- A. 明确自己的职责范围及工作单位的政策及工作要求
- B. 严格执行查对制度
- C. 明确自己的优势和劣势
- D. 委派别人实施护理时，尽量做到心中有数
- E. 尽量独立应用

54.“不同组织部位的炎症多表现红、肿、热、痛、功能障碍的病理改变”，这种认识体现了思维的

- A. 概括性
- B. 间接性
- C. 逻辑性
- D. 物质性
- E. 感知性

55. 下列说法正确的是

- A. 认知技能是护理评判性思维的核心
- B. 批判性思维主要包括智力因素和情感态度两方面
- C. 说明的亚技能不包括证实步骤
- D. 自我调控的亚技能是自我评判
- E. 护理评判性思维的核心目的是做出符合患者利益的决策

56. 患者，女，50岁，因过敏性休克急诊入院。患者恢复期，护患关系的模式应为

- A. 主动-被动型
- B. 共同参与型
- C. 指导-合作型
- D. 服务-指导型
- E. 双向活动

57. 疾病对个体的影响不包括以下哪一项

- A. 生理改变
- B. 心理改变
- C. 自我概念的改变
- D. 家庭角色的改变
- E. 生活方式的改变

58. 一种不可预测的突发事件造成的危机，属于

- A. 发展性危机
- B. 情景性危机
- C. 中间性危机
- D. 继发性危机
- E. 生长性危机

59. 下列关于跨文化理论与护理程序的说法正确的是

- A. 护理评估相当于“日出模式”的Ⅲ级
- B. 从诊断开始，收集与文化有关的差异和共性，并据此选择性地进行文化关怀。
- C. 护理诊断相当于“日出模式”的Ⅳ级
- D. 进行护理诊断后，在护理关怀决策和行为层进行计划和实施
- E. 在“日出模式”中，提到了明确的评价

60. 下列关于《2030年可持续发展议程》中关于全球卫生发展的健康目标正确的是

- A. 到2030年，消除新生儿和5岁以下儿童可预防的死亡。

- B. 到 2030 年，消除艾滋病、热射病、疟疾和被忽视的热带疾病等流行病，抗击肝炎、水传播疾病和其他传染病。
C. 实现全民健康
D. 大幅增加发达国家的卫生筹资
E. 到 2030 年，全球公路交通事故造成的死伤人数减半

二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出二个至五个正确答案，并将其代码分别填在答题纸上，多选、少选、错选均不得分，每小题 2 分，共 60 分）

1. 肺血栓栓塞症（PTE）继发性危险因素包括
 - A. 高龄
 - B. 长期卧床
 - C. 中心静脉插管
 - B. 长途乘车旅行
 - E. 口服避孕药
2. 急性心肌梗死心电图的特征性改变
 - A. ST 段弓背样抬高
 - B. 异常宽而深的 Q 波
 - C. T 波倒置
 - D. T 波高尖
 - E. T 波抬高
3. 护士对使用洋地黄药物患者护理措施正确的是
 - A. 给药前先数心率，<60 次/分不能给药
 - B. 及时询问有无不适
 - C. 发现洋地黄中毒表现立即报告医生
 - D. 如发现漏服，下次应补服
 - E. 对于高龄服药患者应嘱其定期监测血药浓度
4. 肝性脑病患者饮食要点为
 - A. 提供足够的热量，以减少组织蛋白分解产氨
 - B. 肝性脑病急性期禁食蛋白质，给予葡萄糖保证能量供应
 - C. 清醒后可逐步增加蛋白饮食，应以动物蛋白为宜
 - D. 肝性脑病营养要点，重点不在于限制蛋白质摄入，而在于保持正氮平衡
 - E. 口服或静脉使用支链氨基酸制剂较好
5. 患者做完第一次化疗五天后，在家忽然觉得忽冷忽热，测腋温 38.5℃，以电话询问护理人员，此时你给患者的建议是
 - A. 服用退热药，并继续观察
 - B. 在家中休息，多饮水
 - C. 告知患者可能是化疗后出现骨髓抑制的表现
 - D. 立即回医院找医生进行诊治
 - E. 戴口罩，避免接触感冒人群
6. 患者右侧肢体偏瘫，护理时应注意：
 - A. 注意良肢位的摆放
 - B. 患侧肢体可协助洗漱、进食
 - C. 可使用热水袋为患侧肢体保暖
 - D. 尽量不在患侧肢体输液
 - E. 对患侧肢体进行主动、被动活动
7. ARDS 病人临床表现的特点是：
 - A. 急性呼吸窘迫
 - B. 顽固性高碳酸血症
 - C. 顽固性咳嗽

- D. 难治性低氧血症 E. 发作性喘息
8. 肾病综合征共同的临床特征为：
A. 大量蛋白尿（尿蛋白定量 $>3.5\text{g/d}$ ） B. 低蛋白血症（血浆清蛋白 $<30\text{g/L}$ ）
C. 水肿 D. 高脂血症 E. 尿量减少
9. 护理糖尿病酮症酸中毒病人时应尤其注意观察：
A. 呼吸的气味、深度、频度 B. 血糖变化
C. 血压、神志、尿量 D. 关节痛
E. 皮肤有无出血点
10. 动脉硬化闭塞症的护理措施正确的是
A. 保持患肢清洁、干燥
B. 术后第2日可下床活动，以预防深静脉血栓形成
C. 术后患肢安置水平位置
D. 注意病人保暖
E. 进食蔬菜、水果等富含纤维的食物
11. 男性，63岁，右上腹不适1周，CT示右肝多发性占位。拟诊为右肝弥漫性肝癌而行了右肝动脉插管化疗，治疗后护理措施正确的是
A. 嘱病人早期床上活动
B. 严密监测生命体征，腹痛与腹部体征
C. 穿刺处沙袋加压1小时，穿刺侧肢体制动6小时
D. 严密观察穿刺侧肢端皮肤的颜色、温度及足背动脉搏动
E. 术后24~48小时卧床休息
12. 深静脉血栓形成病人护理措施正确的是
A. 急性期10~14日内应绝对卧床 B. 患肢置于心脏水平
C. 遵医嘱给予镇痛药 D. 术前2~3日少渣饮食，术前晚灌肠
E. 术后6小时可进食
13. 吴先生，52岁，因绞窄性肠梗阻行“回肠部分切除术”。术后4天病人出现腹痛，以脐周最为明显，腹腔引流管间断引出血性液每天约200ml。体检：T38.5°C, P95次/分，R22次/分，BP135/76mmHg。腹胀，脐周中度压痛，未扪及肿块，肠鸣音弱。血常规：白细胞 $13.5\times10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞83%。以下护理措施正确的是
A. 取低半坐卧位 B. 予全胃肠外营养 C. 充分负压引流
D. 若引流管堵塞，应高压冲洗 E. 如行灌洗，应用等渗盐水
14. 关于肝内胆管结石特点的叙述正确的是
A. 原发性结石 B. 多见于肝右叶 C. 部分可排出形成肝外胆管结石
D. 多为胆色素结石或以胆色素结石为主的混合性结石
E. 治疗难度相对较大
15. 急性腹膜炎患者行腹腔穿刺检查，下列说法正确的是
A. 胃、十二指肠穿孔时穿刺液呈黄色，混浊状，无臭味
B. 急性化脓性腹膜炎穿刺液呈稀脓性，有臭味
C. 绞窄性肠梗阻可抽出不凝固的血液，臭味重
D. 如是血性渗出液，且淀粉酶含量高，提示坏死性胰腺炎的可能
E. 如抽出不凝固的血液，说明有腹内实质脏器破裂
16. 骨盆骨折的临床表现
A. 血压下降或休克

- B. 局部肿胀，压痛，畸形，瘀斑
C. 骨盆分离及挤压试验阳性
D. 合并腹膜后血肿，膀胱尿道损伤，腹腔脏器损伤等
E. 下肢深静脉血栓
17. 为减少实施肠内营养的病人发生胃肠道不适，采取的措施有
A. 控制营养液输注的量和速度 B. 控制营养液输注的浓度和渗透压
C. 营养液应提前配制 D. 调节营养液的温度
E. 药物需研碎稀释后注入
18. 下列对休克病人的紧急抢救中，哪项是正确的
A. 病人的体位采取头和躯干抬高 15°~20°、下肢抬高 20°~30°
B. 尽量控制活动性大出血，可使用休克服（裤、袜）
C. 保持呼吸道通畅，必要时可做气管插管或气管切开
D. 保持病人安静，避免过多搬动
E. 可间歇吸氧，给氧量每分钟 6~8L
19. 关于戊二醛的使用，下列正确的说法是
A. 盛放消毒剂的容器应加盖，定期检测浓度
B. 戊二醛对手术刀片等碳钢类制品有腐蚀性，浸泡前应加入 0.5% 亚硝酸钠防锈
C. 其灭菌效果受 pH 值影响大，应用强化酸性戊二醛时，先用碳酸氢钠将 pH 值调至 7.5~8.0
D. 灭菌后的物品使用前应用生理盐水冲洗干净
E. 对皮肤、黏膜有刺激性，应注意防护
20. 下列属于易感染人群的是
A. 大手术后的患者 B. 免疫系统功能异常者
C. 危重患者或严重烧伤者 D. 老年人和婴幼儿
E. 长期使用抗生素的患者
21. 保护具的使用原则为
A. 知情同意原则 B. 优先使用原则
C. 短期使用原则 D. 长期使用原则
E. 随时评价原则
22. 氧中毒的临床表现是
A. 恶心并呕吐 B. 胸骨下不适，疼痛
C. 呼吸增快 D. 体温升高
E. 烦躁不安
23. 可作大量不保留灌肠的是
A. 肠道手术术前准备 B. 消化道出血
C. 急性胃穿孔术前准备 D. 肝昏迷
E. 高热
24. 由输血引起的发热反应的原因是
A. 保养液被致热源污染 B. 输血用具被致热源污染
C. 违反无菌操作，造成的污染
D. 输血后产生白细胞抗体和血小板抗体所致
E. 血液内加入高渗或低渗溶液
25. WHO 所推荐的三阶梯镇痛疗法的基本原则包括
A. 口服给药 B. 按时给药

- C. 按阶梯给药 D. 个体化给药
 E. 密切观察药物不良反应及宣教
26. 洗胃的适应证是
 A. 有机磷农药中毒 B. 安眠药中毒
 C. 生物碱中毒 D. 重金属类中毒
 E. 食物中毒
27. 为了及时有效地抢救患者，急救室的物品应做到
 A. 定数量 B. 定期检查维修
 C. 定期消毒灭菌 D. 定专人管理
 E. 定点放置
28. 胸外心脏按压的禁忌证有
 A. 胸廓严重畸形 B. 心包填塞
 C. 广泛性肋骨骨折 D. 心胸外伤
 E. 血气胸
29. 循证护理的基本要素包括
 A. 最佳证据
 B. 护士的专业判断
 C. 病人的意愿和价值观
 D. 证据应用情境
 E. 正确利用评价反馈
30. 专题讲座法是一种传统的健康教育方法，其优点是（）
 A. 适用于除儿童以外的各种大小团体
 B. 能在有限时间内提供容量较大知识和信息
 C. 帮助学习者表达内心世界及行为
 D. 适用于教授某种技术或技巧
 E. 能根据每个人不同特点进行有针对性的教育

三、病例分析题（将答案填写在答题纸上，每题 25 分，共 150 分）

1. 患者王某，男性，59岁，因“反复活动后胸闷不适五年，加重伴气喘1天入院”。诊断：“心功能不全，高血压病3级（极高危组），2型糖尿病”，近日自觉活动后胸闷、气喘需要休息较长时间才能稍有缓解，既往有高血压史25年，自服降压药物控制，血压控制尚可，10年前诊断为2型糖尿病，口服降糖药，血糖控制不详，有吸烟史30年，未戒，目前5-10支/天，喜好荤食、海鲜。

入院后查体：T: 36.8°C P: 82次/分，R: 21次/分，BP: 150/84mmHg，身高172cm，体重85kg，心脏彩超检查：“左心室肥厚，EF45%”，交流过程发现患者不耐烦，家属诉其在家时脾气不好。下午17:30，患者进食晚餐后，因琐事与家人发生争吵，之后突发严重呼吸困难，端坐呼吸，烦躁不安，大汗淋漓，面色苍白，听诊双肺布满湿性啰音，心率126次/分，血压：188/104mmHg。

(1) 该患者具有的心血管疾病危险因素有哪些？

(2) 该患者入院时的心功能分级为几级？

(3) 患者目前出现了什么情况？采取哪些急救措施及护理配合要点？

2. 患者，男，64岁，教师，咳嗽、咳痰、气促20年，加重1月余入院。患者20年前无明显诱因出现咳嗽、咳痰，为白色粘液痰，当时未重视，随年龄增长症状逐渐加重，天气变化受凉后症状明显。1年前因咳嗽、咳痰、气促加重，并出现神志模糊收入院，经无创呼吸机辅助通气、解痉平喘、抗炎、利尿等处理，病情好转后出院，出院后患者坚持家庭氧疗，并长期使用噻托溴铵（思力华）吸入剂，病情控制较好。1个月前患者突感气促、喘息加重，出现夜间阵发性呼吸困难，端坐后呼吸困难可稍缓解，咳痰较前明显增多，为进一步治疗再次入院。

入院后查体：体温37℃，脉搏114次/分、呼吸25次/分、血压130/62mmHg。患者咳嗽、咳痰，为黄色痰液，黏痰不易咳出，气促、喘息明显。急诊血气分析示pH7.42, PaCO₂65mmhg, PaO₂46mmHg。查肺功能示FEV1占预计值16%，FEV1/FVC33%，混合性通气障碍。

(1) 该患者最可能的诊断是什么？

(2) 该患者最主要的护理问题是什么？针对该问题的护理措施有哪些？

(3) 家庭氧疗的注意事项有哪些？

3. 张先生，43岁，中上腹胀痛、呕吐12天急诊入院。患者有反复中腹疼痛10余年，好发于夜间，黑便史2次，药物治疗效果不佳，症状逐渐加重。12天前开始出现中上腹胀痛不适，进食加重，以后出现恶心、呕吐，吐出物为宿食，有酸臭味，常发生在下午和晚上。体检：皮肤干燥、弹性差，唇干；上腹部膨隆，可见胃型和胃蠕动波，用手轻拍上腹部可闻及振水声。

请分析：

(1) 可能的诊断是什么？

(2) 存在哪些护理诊断/问题？

(3) 术前主要的护理措施有哪些？

4. 赵某，女，42岁，因外伤致开放性气胸，查体：病人伤口处可闻及“嘶嘶”样声音，血压83/40mmHg，心率110次/分，呼吸25次/分。

请分析：

(1) 该患者的处理原则是什么？

(2) 如果行闭式胸腔引流，如何使病人引流管保持通畅？

(3) 何时可以考虑为病人拔管？

(4) 拔管后应注意观察哪些方面？

5. 某患者，女，55岁，未婚，独居，体温39.5℃，血压90/60mmHg，脉搏110次/分，诊断呼吸道感染，拟行静脉滴注青霉素1600万单位，既往有使用过青霉素病史，在青霉素皮试后10分钟，该患者感觉胸闷、气促、呼吸困难、面色苍白、四肢发绀、继而出现呕吐、意识丧失。

(1) 列出该患者的主要护理问题？

(2) 写出有针对性的护理措施？

6. 某患者，男，25岁，在高处作业时不慎坠地。急症入院，初步诊断：脾破裂，出血性休克。检查：血压 67/45 mmHg，心率 120 次/ min，脉搏弱，面色苍白，出冷汗，神志清楚，表情淡漠，躁动不安。医嘱：立即输血 200 ml。请问：

(1) 该患者输血的目的是什么？

(2) 输血前需要做哪些准备工作？

(3) 当输入血液约 15 ml 左右时患者突然出现发冷、颤抖、胸闷、腰背酸痛、四肢麻木等症状，护士应将如何处理？